

Demostración de la Conjetura de Goldbach

Autor: Ramón Ruiz

Mayo 2014

Resumen.

Enunciado de la Conjetura de Goldbach: “Todo número par mayor de 2 se puede expresar como la suma de dos números primos”.

Inicialmente, para demostrar esta conjetura se pueden formar dos sucesiones (**A** y **B**), diferentes para cada número par, con todos los números naturales con posibilidades de ser primos que sumados, por parejas, den el número par correspondiente.

El estudio del modo como se emparejan, en general, todos los términos no primos de la sucesión **A** con términos de la sucesión **B**, o viceversa, para obtener el número par, y observando que siempre se forman algunas parejas de primos, nos permite desarrollar una fórmula, no probabilística, para calcular de un modo aproximado el número de pares de primos que cumplirán la conjetura para un número par x . El resultado de esta fórmula siempre es igual o mayor que 1 y tiende a infinito cuando x tiende a infinito lo que permite afirmar que la Conjetura de Goldbach es verdadera.

En este trabajo se ha usado, aparte de algunos axiomas, el teorema de los números primos enunciado por Gauss y el teorema de los números primos para progresiones aritméticas.

1. Números primos y números compuestos.

Se denomina *primo* a todo número natural, mayor que 1, que solo tiene dos divisores, el 1 y el propio número.

Ejemplos de números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Tal como demostró el matemático griego Euclides, existen infinitos números primos aunque son más escasos a medida que avanzamos en la recta numérica.

Excepcionalmente el 2 y el 3, todos los números primos son de la forma $(6n + 1)$ o $(6n - 1)$ siendo n número natural.

Podemos diferenciar a los primos 2, 3 y 5 del resto. El 2 es el primer primo y el único que es par, el 3 es el único de la forma $(6n - 3)$ y el 5 es el único acabado en 5. Todos los otros primos son impares y su cifra final será 1, 3, 7 o 9.

En contraposición a los números primos, se denomina *compuesto* a todo número natural que tiene más de dos divisores.

Ejemplos de números compuestos: 4 (divisores 1, 2, 4), 6 (1, 2, 3, 6), 15 (1, 3, 5, 15), 24 (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24).

Excepto el 1 todo número natural es primo o compuesto. Por convenio, el número 1 no se considera ni primo ni compuesto ya que solo tiene un divisor. Como no puede cumplir la conjetura, y para esta demostración, incluiremos el 1 en el conjunto de los números compuestos sin que esta cuestión tenga ninguna relevancia en el desarrollo o en el resultado final.

Podemos clasificar el conjunto de los números primos (excepto 2, 3 y 5) en 8 grupos dependiendo de la situación de cada uno de ellos respecto a múltiplos de 30, ($30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$). Siendo $n = 0, 1, 2, 3, 4, \dots, \infty$.

$30n + 1$ $30n + 7$ $30n + 11$ $30n + 13$ $30n + 17$ $30n + 19$ $30n + 23$ $30n + 29$

Estas expresiones representan todas las progresiones aritméticas de módulo 30, ($30n + b$), tales que $\text{mcd}(30, b) = 1$ siendo $30 > b > 0$. Estos 8 grupos contienen todos los números primos (excepto 2, 3 y 5). También incluyen el 1 y todos los números compuestos que sean múltiplos de primos mayores que 5. Al ser 30 y b primos entre sí no pueden contener múltiplos de 2 ni de 3 ni de 5.

Lógicamente, a medida que aumenta n disminuye la proporción de primos y aumenta la de compuestos que hay en cada grupo.

Enunciado del teorema de Dirichlet^[1]: “Una progresión aritmética ($an + b$) tal que $\text{mcd}(a, b) = 1$ contiene infinitos números primos”. Aplicando este teorema a los 8 grupos descritos podemos afirmar que cada uno de ellos contiene infinitos números primos.

También se puede aplicar el teorema de los números primos para progresiones aritméticas^[2]: “Para todo módulo a , los números primos tienden a distribuirse equitativamente entre las diferentes progresiones ($an + b$) tales que $\text{mcd}(a, b) = 1$ ”.

Para verificar la precisión de este teorema y mediante un autómata programable (PLC), como los usados para el control automático de máquinas, he obtenido los siguientes datos:

Hay 50.847.531 primos menores que 10^9 , (2, 3 y 5 no incluidos), distribuidos del siguiente modo:

Grupo	$(30n + 1)$	6.355.189 primos	12,49852033 %	$50.847.531 / 6.355.189 = 8,0009471$
Grupo	$(30n + 7)$	6.356.475 primos	12,50104946 %	$50.847.531 / 6.356.475 = 7,999328401$
Grupo	$(30n + 11)$	6.356.197 primos	12,50050273 %	$50.847.531 / 6.356.197 = 7,999678267$
Grupo	$(30n + 13)$	6.356.062 primos	12,50023723 %	$50.847.531 / 6.356.062 = 7,999848176$
Grupo	$(30n + 17)$	6.355.839 primos	12,49979866 %	$50.847.531 / 6.355.839 = 8,000128858$
Grupo	$(30n + 19)$	6.354.987 primos	12,49812307 %	$50.847.531 / 6.354.987 = 8,001201419$
Grupo	$(30n + 23)$	6.356.436 primos	12,50097276 %	$50.847.531 / 6.356.436 = 7,999377481$
Grupo	$(30n + 29)$	6.356.346 primos	12,50079576 %	$50.847.531 / 6.356.346 = 7,999490745$

Podemos comprobar que la desviación máxima para 10^9 , (entre 6.354.987 y el valor medio 6.355.941), es menor que 0,01502 %.

Deduzco que, en cumplimiento de este teorema, la desviación máxima tiende a 0 % a medida que analizamos números más grandes.

2. Casos especiales de la conjetura.

Como hemos visto, los números 2, 3 y 5 son diferentes del resto de primos y no están incluidos en los 8 grupos descritos. Estudiaremos, como casos especiales, los números pares 4, 6, 8, 10, 12 y 16 cuyas soluciones para cumplir la conjetura contienen el 2, el 3 o el 5. Escribiremos todas las parejas posibles para estos números pares resaltando en **negrita** los números primos.

$$\begin{array}{ll} 4 = 1 + \mathbf{3} = \mathbf{2} + \mathbf{2} & 4 = \mathbf{2} + \mathbf{2} \quad (\text{única con el primo } 2) \\ 6 = 1 + \mathbf{5} = \mathbf{2} + 4 = \mathbf{3} + \mathbf{3} & 6 = \mathbf{3} + \mathbf{3} \\ 8 = 1 + \mathbf{7} = \mathbf{2} + 6 = \mathbf{3} + \mathbf{5} = 4 + 4 & 8 = \mathbf{3} + \mathbf{5} \\ 10 = 1 + 9 = \mathbf{2} + 8 = \mathbf{3} + \mathbf{7} = 4 + 6 = \mathbf{5} + \mathbf{5} & 10 = \mathbf{3} + \mathbf{7} = \mathbf{5} + \mathbf{5} \\ 12 = 1 + \mathbf{11} = \mathbf{2} + 10 = \mathbf{3} + 9 = 4 + 8 = \mathbf{5} + \mathbf{7} = 6 + 6 & 12 = \mathbf{5} + \mathbf{7} \\ 16 = 1 + 15 = \mathbf{2} + 14 = \mathbf{3} + \mathbf{13} = 4 + 12 = \mathbf{5} + \mathbf{11} = 6 + 10 = \mathbf{7} + 9 = 8 + 8 & 16 = \mathbf{3} + \mathbf{13} = \mathbf{5} + \mathbf{11} \end{array}$$

Comprobamos que los pares 4, 6, 8, 10, 12 y 16 se pueden expresar como suma de dos primos. Para el resto de números pares se debe demostrar o verificar que cumplen la conjetura mediante una o varias parejas de primos que no contengan ni el 3 ni el 5.

3. Clasificación de los números pares.

Del mismo modo que hemos hecho con los números primos, dividiremos el conjunto de todos los números pares (2, 4, 6, 8, 10, ...) en 15 grupos dependiendo de la situación de cada uno de ellos respecto a múltiplos de 30. Siendo $n = 0, 1, 2, 3, 4, \dots, \infty$.

$$\begin{array}{lll} 30n + 2 & 30n + 12 & 30n + 22 \\ 30n + 4 & 30n + 14 & 30n + 24 \\ 30n + 6 & 30n + 16 & 30n + 26 \\ 30n + 8 & 30n + 18 & 30n + 28 \\ 30n + 10 & 30n + 20 & 30n + 30 \end{array}$$

4. Combinar grupos de números pares y grupos de números primos.

Ahora reuniremos los grupos de números pares y los de números primos para expresar las 36 combinaciones posibles de la conjetura de Goldbach. Podemos comprobar que cada grupo de números pares tiene sus propias combinaciones diferentes del resto.

$$30n_1 + 2 = (30n_2 + 1) + (30n_3 + 1) = (30n_4 + 13) + (30n_5 + 19)$$

$$\text{Siendo: } n_1 = n_2 + n_3 = n_4 + n_5 + 1$$

Comprobamos que para los números pares $(30n + 2)$ resultan 2 combinaciones diferentes usando 3 grupos de primos.

Para el número 2 solo se puede aplicar la combinación $2 = 1 + 1$. Este número par está excluido en el enunciado de la conjetura.

$$30n_1 + 4 = (30n_2 + 11) + (30n_3 + 23) = (30n_4 + 17) + (30n_5 + 17)$$

$$\text{Siendo: } n_1 = n_2 + n_3 + 1 = n_4 + n_5 + 1$$

Resultan 2 combinaciones usando 3 grupos de primos.

Estas combinaciones no se pueden aplicar al número 4 por lo que, tal como he indicado, es considerado caso especial, $(4 = 2 + 2)$.

$$30n_1 + 6 = (30n_2 + 7) + (30n_3 + 29) = (30n_4 + 13) + (30n_5 + 23) = (30n_6 + 17) + (30n_7 + 19)$$

$$\text{Siendo: } n_1 = n_2 + n_3 + 1 = n_4 + n_5 + 1 = n_6 + n_7 + 1$$

Resultan 3 combinaciones usando 6 grupos de primos.

Estas combinaciones no se pueden aplicar al número 6 por lo que es considerado caso especial, $(6 = 3 + 3)$.

$$30n_1 + 8 = (30n_2 + 1) + (30n_3 + 7) = (30n_4 + 19) + (30n_5 + 19)$$

$$\text{Siendo: } n_1 = n_2 + n_3 = n_4 + n_5 + 1$$

Resultan 2 combinaciones usando 3 grupos de primos.

Para el número 8 solo la combinación $8 = 1 + 7$ que no cumple la conjetura por lo que el 8 es considerado caso especial, $(8 = 3 + 5)$.

$$30n_1 + 10 = (30n_2 + 11) + (30n_3 + 29) = (30n_4 + 17) + (30n_5 + 23)$$

$$\text{Siendo: } n_1 = n_2 + n_3 + 1 = n_4 + n_5 + 1$$

Resultan 2 combinaciones usando 4 grupos de primos.

Estas combinaciones no se pueden aplicar al número 10 por lo que es considerado caso especial, $(10 = 3 + 7 = 5 + 5)$.

$$30n_1 + 12 = (30n_2 + 1) + (30n_3 + 11) = (30n_4 + 13) + (30n_5 + 29) = (30n_6 + 19) + (30n_7 + 23)$$

$$\text{Siendo: } n_1 = n_2 + n_3 = n_4 + n_5 + 1 = n_6 + n_7 + 1$$

Resultan 3 combinaciones usando 6 grupos de primos.

Para el número 12 solo la combinación $12 = 1 + 11$ que no cumple la conjetura por lo que es considerado caso especial, $(12 = 5 + 7)$.

$$30n_1 + 14 = (30n_2 + 1) + (30n_3 + 13) = (30n_4 + 7) + (30n_5 + 7)$$

Siendo: $n_1 = n_2 + n_3 = n_4 + n_5$

Resultan 2 combinaciones usando 3 grupos de primos.

$$30n_1 + 16 = (30n_2 + 17) + (30n_3 + 29) = (30n_4 + 23) + (30n_5 + 23)$$

Siendo: $n_1 = n_2 + n_3 + 1 = n_4 + n_5 + 1$

Resultan 2 combinaciones usando 3 grupos de primos.

Estas combinaciones no se pueden aplicar al número 16 por lo que es considerado caso especial, ($16 = 3 + 13 = 5 + 11$).

$$30n_1 + 18 = (30n_2 + 1) + (30n_3 + 17) = (30n_4 + 7) + (30n_5 + 11) = (30n_6 + 19) + (30n_7 + 29)$$

Siendo: $n_1 = n_2 + n_3 = n_4 + n_5 = n_6 + n_7 + 1$

Resultan 3 combinaciones usando 6 grupos de primos.

Para el número 18 solo se pueden aplicar las combinaciones $18 = 1 + 17 = 7 + 11$. (También: $18 = 5 + 13$).

$$30n_1 + 20 = (30n_2 + 1) + (30n_3 + 19) = (30n_4 + 7) + (30n_5 + 13)$$

Siendo: $n_1 = n_2 + n_3 = n_4 + n_5$

Resultan 2 combinaciones usando 4 grupos de primos.

$$30n_1 + 22 = (30n_2 + 11) + (30n_3 + 11) = (30n_4 + 23) + (30n_5 + 29)$$

Siendo: $n_1 = n_2 + n_3 = n_4 + n_5 + 1$

Resultan 2 combinaciones usando 3 grupos de primos.

Para el número 22 solo se puede aplicar la combinación $22 = 11 + 11$. (También: $22 = 3 + 19 = 5 + 17$).

$$30n_1 + 24 = (30n_2 + 1) + (30n_3 + 23) = (30n_4 + 7) + (30n_5 + 17) = (30n_6 + 11) + (30n_7 + 13)$$

Siendo: $n_1 = n_2 + n_3 = n_4 + n_5 = n_6 + n_7$

Resultan 3 combinaciones usando 6 grupos de primos.

$$30n_1 + 26 = (30n_2 + 7) + (30n_3 + 19) = (30n_4 + 13) + (30n_5 + 13)$$

Siendo: $n_1 = n_2 + n_3 = n_4 + n_5$

Resultan 2 combinaciones usando 3 grupos de primos.

$$30n_1 + 28 = (30n_2 + 11) + (30n_3 + 17) = (30n_4 + 29) + (30n_5 + 29)$$

Siendo: $n_1 = n_2 + n_3 = n_4 + n_5 + 1$

Resultan 2 combinaciones usando 3 grupos de primos.

Para el número 28 solo se puede aplicar la combinación $28 = 11 + 17$. (También: $28 = 5 + 23$).

$$30n_1 + 30 = (30n_2 + 1) + (30n_3 + 29) = (30n_4 + 7) + (30n_5 + 23) = (30n_6 + 11) + (30n_7 + 19) = (30n_8 + 13) + (30n_9 + 17)$$

Siendo: $n_1 = n_2 + n_3 = n_4 + n_5 = n_6 + n_7 = n_8 + n_9$

Resultan 4 combinaciones usando los 8 grupos de primos disponibles.

Observamos que los números pares no múltiplos de 6 ni de 10 tienen 2 combinaciones diferentes usando 3 grupos de primos.

Los múltiplos de 6, $(30n + 6)$, $(30n + 12)$, $(30n + 18)$ y $(30n + 24)$ tienen 3 combinaciones diferentes usando 6 grupos de primos.

Los múltiplos de 10, $(30n + 10)$ y $(30n + 20)$ tienen 2 combinaciones diferentes usando 4 grupos de primos.

Los múltiplos de 30, $(30n + 30)$, tienen 4 combinaciones diferentes usando los 8 grupos de primos disponibles.

Es lógico pensar que, dado un número par, el número de parejas de primos (también llamadas particiones de Goldbach) que cumplirán la conjetura estará en relación con la cantidad de grupos de primos usados (3, 4, 6 o 8). Ejemplos:

3600 125 particiones. 8 grupos. Múltiplo de 30.

3606 90 particiones. 6 grupos. Múltiplo de 6.

3602 48 particiones. 3 grupos.

3610 66 particiones. 4 grupos. Múltiplo de 10.

Como dato sorprendente podemos comprobar que, debido al número de grupos de primos usados, números pares consecutivos tienen una diferencia notable en el número de particiones. Ejemplo: 3600 tiene 125 particiones y 3602 solo 48.

5. Ejemplo.

Se puede aplicar lo descrito hasta ahora al número 784 sirviendo como ejemplo para cualquiera de las 36 combinaciones expuestas y para cualquier número par x aunque sea muy grande. Usaré la lista de los números primos menores que 1.000.

$$784 = 30 \cdot 26 + 4 = (30n_2 + 11) + (30n_3 + 23) = (30n_4 + 17) + (30n_5 + 17) \quad \text{siendo: } 26 = n_2 + n_3 + 1 = n_4 + n_5 + 1$$

Para la combinación $784 = (30n_2 + 11) + (30n_3 + 23)$ escribiremos la sucesión **A** de todos los números $(30n_2 + 11)$ desde 0 a 784. Escribiremos también la sucesión **B** de todos los números $(30n_3 + 23)$ desde 784 a 0. Resaltamos en **negrita** los números primos.

A 11 - 41 - 71 - 101-131-161-191-221-251-281-311-341-371-401-431-461-491-521-551-581-611-641-671-701-731-761
B 773-743-713-683-653-623-593-563-533-503-473-443-413-383-353-323-293-263-233-203-173-143-113 - 83 - 53 - 23

La segunda combinación, $784 = (30n_4 + 17) + (30n_5 + 17)$, usa el mismo grupo de primos para las dos sucesiones. Escribiremos la sucesión **A** de todos los números $(30n_4 + 17)$ desde 0 a 392 (mitad de 784). Escribiremos también la sucesión **B** de todos los números $(30n_5 + 17)$ desde 784 a 392.

A 17 - 47 - 77 - 107-137-167-197-227-257-287-317-347-377
B 767-737-707-677-647-617-587-557-527-497-467-437-407

Ordenados de esta manera, cada término de una sucesión **A** se puede sumar con su pareja de la sucesión **B** para obtener 784. En las 4 sucesiones anteriores están subrayadas las 18 parejas de primos que cumplen la conjetura para el número 784.

El estudio de las sucesiones **A** y **B**, individual y en conjunto, es la base de esta demostración. Analizaré las sucesiones completas, (**A** desde 0 a x y **B** desde x a 0). Para la fórmula final se tendrán en cuenta las sucesiones medias.

Para calcular el número de términos de cada una de las sucesiones **A** o **B** recordemos que son progresiones aritméticas de módulo 30.

$\frac{x}{30}$ Número de términos de cada sucesión **A** o **B** para el número par x . Obviamente es igual al número de parejas que se forman. (26 términos en cada sucesión y 26 parejas que se forman para $x = 784$).

Analizando, con carácter general, la fórmula anterior tenemos:

Número de términos y de parejas = resultado fórmula	si x es múltiplo de 30
Número de términos y de parejas = parte entera resultado	si $n_1 = n_2 + n_3 + 1$
Número de términos y de parejas = (parte entera resultado) + 1	si $n_1 = n_2 + n_3$

6. La conjetura aplicada a números pares pequeños.

Según hemos visto, los números compuestos presentes en los 8 grupos de primos serán múltiplos solamente de primos mayores que 5 (primos 7, 11, 13, 17, 19, 23,...). Indico a continuación los primeros números compuestos que aparecen en ellos.

$49 = 7^2$ $77 = 7 \cdot 11$ $91 = 7 \cdot 13$ $119 = 7 \cdot 17$ $121 = 11^2$ $133 = 7 \cdot 19$ $143 = 11 \cdot 13$ $161 = 7 \cdot 23$ $169 = 13^2$

Y así sucesivamente formando productos, de dos o más factores, con primos mayores que 5.

De lo expuesto deducimos que para números pares menores que 49, todos los términos de las sucesiones **A-B** correspondientes serán números primos (excepto el 1) y todas las parejas cumplirán la conjetura de Goldbach (excepto las que contengan el 1).

Escribimos todas las parejas entre los términos de las sucesiones **A-B** de números pares menores que 49 (excepto casos especiales).

$14 = 1 + 13 = 7 + 7$	$34 = 11 + 23 = 17 + 17$
$18 = 1 + 17 = 7 + 11$	$36 = 7 + 29 = 13 + 23 = 17 + 19$
$20 = 1 + 19 = 7 + 13$	$38 = 1 + 37 = 31 + 7 = 19 + 19$
$22 = 11 + 11$	$40 = 11 + 29 = 17 + 23$
$24 = 1 + 23 = 7 + 17 = 11 + 13$	$42 = 1 + 41 = 31 + 11 = 13 + 29 = 19 + 23$
$26 = 7 + 19 = 13 + 13$	$44 = 1 + 43 = 31 + 13 = 7 + 37$
$28 = 11 + 17$	$46 = 17 + 29 = 23 + 23$
$30 = 1 + 29 = 7 + 23 = 11 + 19 = 13 + 17$	$48 = 1 + 47 = 31 + 17 = 7 + 41 = 37 + 11 = 19 + 29$
$32 = 1 + 31 = 13 + 19$	

Por otro lado, observamos que en las sucesiones **A-B** completas del número 784, usado como ejemplo, predominan los números primos (17 primos y 9 compuestos en la sucesión **A** y 18 primos y 8 compuestos en la **B**).

Este hecho se manifiesta para números pares pequeños (hasta $x \approx 4.500$).

Por lo tanto, para números pares menores que 4.500 está asegurado el cumplimiento de la conjetura de Goldbach con las sucesiones **A** y **B** ya que, aún en el caso hipotético que todos los números compuestos estén emparejados con números primos, siempre sobrarán, en las dos sucesiones, algunos primos que formarán parejas entre ellos. Aplicando este razonamiento al número 784 tendríamos:

$17 - 8 = 18 - 9 = 9$ parejas de primos como mínimo (en el capítulo anterior podemos comprobar que son 12 parejas reales).

7. Aplicando el razonamiento lógico a la conjetura.

Las sucesiones **A** y **B** están formadas por términos que pueden ser números compuestos o números primos que forman parejas entre ellos. Para diferenciar, definiré como **compuesto libre** aquel que no está emparejado con otro compuesto por lo que su pareja será un número primo de la otra sucesión. Por lo tanto, las parejas entre los términos de las sucesiones **A-B** estarán formadas por:

(Número compuesto sucesión **A**) + (Número compuesto sucesión **B**) (parejas **CC**)
 (Número compuesto libre de **A** o de **B**) + (Número primo de **B** o de **A**) (parejas **CP-PC**)
 (Número primo sucesión **A**) + (Número primo sucesión **B**) (parejas **PP**)

Sustituyamos los números primos por **P** y los compuestos por **C** en las sucesiones **A-B** del número 784 usado como ejemplo.

A P P **P** P P **C** P **C** **P** P **P** **C** **C** P P **P** P P **C** **C** **C** **P** **C** P **C** P
B P P **C** P P **C** P **P** **C** P **C** **P** **C** P P **C** P P **P** **C** **P** **C** P P P

El número de parejas primo-primo (P_{PP}) que se formen dependerá del número de compuestos (libres) que estén emparejados con primos de la otra sucesión. Con carácter general, se cumplirá el siguiente axioma:

$$P_{PP} = (\text{N}^\circ \text{ de primos sucesión } \mathbf{A}) - (\text{N}^\circ \text{ de compuestos libres suces. } \mathbf{B}) = (\text{N}^\circ \text{ de primos suces. } \mathbf{B}) - (\text{N}^\circ \text{ de compuestos libres suces. } \mathbf{A})$$

Para el número 784: $P_{PP} = 17 - 5 = 18 - 6 = 12$ parejas de primos en las sucesiones **A-B**.

Considero que este axioma es perfectamente válido aunque sea muy simple y “evidente”. Se usará más adelante en la demostración.

Teniendo en cuenta el axioma anterior, deduzco que siempre se deben formar las suficientes parejas de números compuestos entre las dos sucesiones para que los compuestos de la sucesión **A** que queden libres no superen en número a los primos de la sucesión **B**.

Inversamente, los compuestos de la sucesión **B** que queden libres no deben superar en número a los primos de la sucesión **A**.

Esto es especialmente importante para sucesiones **A-B** de números pares muy grandes en las que la proporción de números primos es mucho menor que la de compuestos.

Esta cuestión se verá con más detalle cuando se aplique el álgebra a las sucesiones **A-B**.

Analicemos, escuetamente, como se forman las diferentes clases de parejas entre los términos de las sucesiones **A-B**.

Un número compuesto de la sucesión **A** estará emparejado con un compuesto de la sucesión **B** si ambos, como pareja, cumplen unas condiciones que dependerán de las características del número par x (si es una potencia de 2 o múltiplo de una potencia de 3 o de 5 o múltiplo de uno o varios primos mayores que 5, etc.).

Los números compuestos de cada sucesión que no consigan un compuesto de la otra para cumplir las condiciones requeridas estarán emparejados con un número primo (con el cual sí que las cumplirán).

Finalmente, los números primos sobrantes de las dos sucesiones formarán las parejas que cumplirán la conjetura.

Esta cuestión se verá con más detalle en el próximo capítulo.

Con lo descrito anteriormente se puede idear un razonamiento lógico que permita deducir que la conjetura de Goldbach es verdadera. Más adelante se desarrollará una fórmula general para calcular, de un modo aproximado, el número de particiones.

Tal como he indicado, el cumplimiento de la conjetura está asegurado para números pares pequeños (menores que 4.500) ya que en las sucesiones **A-B** correspondientes predominan los números primos. Por lo tanto, en estas sucesiones encontraremos parejas **PP** (por haber mayoría de primos) y si hay números compuestos, parejas **CC** y parejas **CP-PC**.

Si verificamos números cada vez más grandes notamos que ya predominan los números compuestos y disminuye la proporción de primos. Supongamos que hay un número par suficientemente grande que no cumple la conjetura. En este supuesto, con todas las sucesiones **A-B** de este número (recordemos, 2, 3 o 4 combinaciones de grupos de primos dependiendo del número par) solo podríamos formar parejas **CC** y parejas **CP-PC** entendiendo que todos los números compuestos libres de cada combinación **A-B** se emparejarían con todos los números primos de la misma combinación con una extraordinaria precisión matemática.

¿Qué pasará, entonces, para números pares mayores que el que, supuestamente, no cumple?

Podemos suponer que ya no se cumplirá la conjetura a partir del primer par que no la cumpla pero no es posible porque siempre habrá números primos mayores que él y que sumados a otros primos nos darán números pares más grandes que sí que la cumplirán.

Por otro lado tenemos que a medida que aumenta x , aumenta la proporción de números compuestos y disminuye la de primos por lo que podríamos suponer que, para números muy grandes, algunos números compuestos se quedarán sin pareja por no haber suficientes primos, lo cual, evidentemente, no es posible porque a cada término de una sucesión **A** le corresponde una pareja en la **B** y viceversa.

Al no ser posible los dos supuestos anteriores he de concluir, sin que sirva como demostración, que no encontraremos un número par que no la cumpla. Por lo tanto, deduzco que la Conjetura de Goldbach es verdadera.

Más adelante reforzaré esta deducción mediante la fórmula para calcular el número aproximado de particiones para un número par x .

8. Estudiando cómo se forman las parejas entre los términos de las sucesiones A-B.

Analizaré cómo se forman las parejas compuesto-compuesto con las sucesiones **A** y **B**. Cuanto mayor es la proporción de parejas CC quedan menos compuestos libres que necesiten un primo como pareja y, por lo tanto, habrá más números primos para emparejarse.

El secreto de la Conjetura de Goldbach está en el número de parejas compuesto-compuesto que se forman con las sucesiones A y B.

Para la siguiente exposición consideremos m número natural no múltiplo de 2 ni de 3 ni de 5 y j número natural (incluido el 0).

Supongamos que el número par x al que aplicamos la conjetura sea múltiplo del primo 7, ($x = 7q$ siendo q número par).

En este caso, cualquier múltiplo de 7 ($7m_1$) de la sucesión **A** tendrá como pareja a un múltiplo de 7 ($7m_2$) de la sucesión **B** de modo que la suma de los dos números cumpla la condición de ser múltiplo de 7 ($7q$) tal como hemos supuesto para x .

Ampliando este axioma, se puede afirmar que todos los múltiplos de 7 ($7m_1$) (incluido el primo 7 si lo hubiera) de la sucesión **A** estarán emparejados con todos los múltiplos de 7 ($7m_2$) (incluido el primo 7 si lo hubiera) de la sucesión **B**.

$$x = 7q = 7m_1 + 7m_2 = 7(m_1 + m_2) \quad \text{siendo: } q = m_1 + m_2$$

Aplicamos lo anterior al número $784 = 7 \cdot 112$. Sirve como ejemplo para cualquier número par múltiplo de 7 aunque sea muy grande. Escribimos las sucesiones **A-B** correspondientes subrayando los múltiplos de 7.

A 11 - 41 - 71 - 101-131-161-191-221-251-281-311-341-371-401-431-461-491-521-551-581-611-641-671-701-731-761
B 773-743-713-683-653-623-593-563-533-503-473-443-413-383-353-323-293-263-233-203-173-143-113 - 83 - 53 - 23

Comprobamos: $784 = 7 \cdot 112 = 7m_1 + 7m_2 = 161 + 623 = 371 + 413 = 581 + 203$ siendo: $112 = 23 + 89 = 53 + 59 = 83 + 29$

Observamos que las parejas de múltiplos de 7 se pueden “tachar” de las sucesiones **A-B** sin afectar a las parejas de primos.

Igualmente pasaría si el número par fuera múltiplo de cualquier otro primo mayor que 5 y menor que \sqrt{x} .

Matemáticamente, son suficientes los primos menores que \sqrt{x} para definir a todos los números compuestos de las sucesiones **A-B**.

Si fuera múltiplo de varios primos mayores que 5, se formarían más parejas CC quedando menos compuestos libres lo cual daría más posibilidades a los números primos para emparejarse entre ellos. Por ejemplo, el número $2.002 = 2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ tiene 44 particiones mientras que el número $2.048 = 2^{11}$, que es mayor, solo tiene 25. En el caso hipotético que el número par x fuera múltiplo de todos los primos menores que \sqrt{x} , (por supuesto, no es posible), no quedaría ningún compuesto libre y, por lo tanto, todos los primos de las sucesiones **A-B** se emparejarían entre sí (excepto los menores que \sqrt{x}).

El caso más desfavorable es cuando el número par x no sea múltiplo de primos mayores que 5. Ejemplo: $512 = 2^9$ $\sqrt{512} = 22,62$

Para estos números pares, y siguiendo el orden de números primos (7, 11, 13, 17, 19, ..., anterior a \sqrt{x}), podemos anotar:

$x = 7r + a$	siendo: $r =$ número natural	$a =$ número natural < 7	$512 = 7 \cdot 73 + 1$	$a = 1$
$x = 11s + b$	siendo: $s =$ número natural	$b =$ número natural < 11	$512 = 11 \cdot 46 + 6$	$b = 6$
$x = 13t + c$	siendo: $t =$ número natural	$c =$ número natural < 13	$512 = 13 \cdot 39 + 5$	$c = 5$
$x = 17u + d$	siendo: $u =$ número natural	$d =$ número natural < 17	$512 = 17 \cdot 30 + 2$	$d = 2$
$x = 19v + e$	siendo: $v =$ número natural	$e =$ número natural < 19	$512 = 19 \cdot 26 + 18$	$e = 18$

Y así sucesivamente hasta el primo anterior a \sqrt{x} .

En este caso, cualquier múltiplo de 7 ($7m_{11}$) de la sucesión **A** tendrá como pareja a un término ($7j_{21} + a$) de la sucesión **B** de modo que la suma de los dos números cumpla la condición ($7r + a$) tal como se ha supuesto para x .

Inversamente, cualquier término ($7j_{11} + a$) de la sucesión **A** tendrá como pareja a un múltiplo de 7 ($7m_{21}$) de la sucesión **B** de modo que, igualmente, la suma de los dos números cumpla la condición ($7r + a$).

Ampliando este axioma, se puede afirmar que todos los múltiplos de 7 ($7m_{11}$) (incluido el primo 7 si lo hubiera) de la sucesión **A** estarán emparejados con todos los términos ($7j_{21} + a$) de la sucesión **B**.

Inversamente, todos los términos ($7j_{11} + a$) de la sucesión **A** estarán emparejados con todos los múltiplos de 7 ($7m_{21}$) (incluido el primo 7 si lo hubiera) de la sucesión **B**.

Aplicando el axioma anterior a todos los primos, desde el 7 hasta el anterior a \sqrt{x} , se puede afirmar que todos los grupos de múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, 13m_{13}, 17m_{14}, \dots$ (incluidos los primos menores que \sqrt{x} que estén presentes) de la sucesión **A** estarán emparejados, grupo con grupo, con todos los grupos de términos ($7j_{21} + a$), ($11j_{22} + b$), ($13j_{23} + c$), ($17j_{24} + d$), ... de la sucesión **B**.

Inversamente, todos los grupos de términos ($7j_{11} + a$), ($11j_{12} + b$), ($13j_{13} + c$), ($17j_{14} + d$), ... de la sucesión **A** estarán emparejados, grupo con grupo, con todos los grupos de múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, 13m_{23}, 17m_{24}, \dots$ (incluidos los primos menores que \sqrt{x} que estén presentes) de la sucesión **B**.

$$\begin{aligned}
x &= 7r + a = 7m_{11} + (7j_{21} + a) = 7(m_{11} + j_{21}) + a && \text{siendo: } r = m_{11} + j_{21} \\
x &= 11s + b = 11m_{12} + (11j_{22} + b) = 11(m_{12} + j_{22}) + b && \text{siendo: } s = m_{12} + j_{22} \\
x &= 13t + c = 13m_{13} + (13j_{23} + c) = 13(m_{13} + j_{23}) + c && \text{siendo: } t = m_{13} + j_{23} \\
x &= 17u + d = 17m_{14} + (17j_{24} + d) = 17(m_{14} + j_{24}) + d && \text{siendo: } u = m_{14} + j_{24}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
x &= 7r + a = (7j_{11} + a) + 7m_{21} = 7(j_{11} + m_{21}) + a && \text{siendo: } r = j_{11} + m_{21} \\
x &= 11s + b = (11j_{12} + b) + 11m_{22} = 11(j_{12} + m_{22}) + b && \text{siendo: } s = j_{12} + m_{22} \\
x &= 13t + c = (13j_{13} + c) + 13m_{23} = 13(j_{13} + m_{23}) + c && \text{siendo: } t = j_{13} + m_{23} \\
x &= 17u + d = (17j_{14} + d) + 17m_{24} = 17(j_{14} + m_{24}) + d && \text{siendo: } u = j_{14} + m_{24}
\end{aligned}$$

Y así sucesivamente hasta el primo anterior a \sqrt{x} .

Aplicamos lo anterior al número $512 = 7 \cdot 73 + 1 = 11 \cdot 46 + 6 = 13 \cdot 39 + 5 = 17 \cdot 30 + 2 = 19 \cdot 26 + 18$.

Sirve como ejemplo para cualquier número par x aunque sea muy grande. Escribimos las sucesiones **A-B** correspondientes.

A **13 - 43 - 73- 103-133-163-193-223-253-283-313-343-373-403-433-463-493** Subrayados los múltiplos $7m_{11}$ en **A**
B **499-469-439-409-379-349-319-289-259-229-199-169-139-109 - 79 - 49 - 19** Subrayados los términos $(7j_{21} + 1)$ en **B**

Comprobamos: $512 = 7 \cdot 73 + 1 = 7m_{11} + (7j_{21} + 1) = 133 + 379 = 343 + 169$ siendo: $73 = 19 + 54 = 49 + 24$

A **13 - 43 - 73- 103-133-163-193-223-253-283-313-343-373-403-433-463-493** Subrayados los términos $(7j_{11} + 1)$ en **A**
B **499-469-439-409-379-349-319-289-259-229-199-169-139-109 - 79 - 49 - 19** Subrayados los múltiplos $7m_{21}$ en **B**

Comprobamos: $512 = 7 \cdot 73 + 1 = (7j_{11} + 1) + 7m_{21} = 43 + 469 = 253 + 259 = 463 + 49$ siendo: $73 = 6 + 67 = 36 + 37 = 66 + 7$

Aplicando el mismo procedimiento para los primos 11, 13, 17 y 19 tendremos:

Para el primo 11: $512 = 11 \cdot 46 + 6 = 11m_{12} + (11j_{22} + 6) = 253 + 259$ siendo: $46 = 23 + 23$
 $512 = 11 \cdot 46 + 6 = (11j_{12} + 6) + 11m_{22} = 193 + 319$ siendo: $46 = 17 + 29$

Para el primo 13: $512 = 13 \cdot 39 + 5 = 13m_{13} + (13j_{23} + 5) = 13 + 499 = 403 + 109$ siendo: $39 = 1 + 38 = 31 + 8$
 $512 = 13 \cdot 39 + 5 = (13j_{13} + 5) + 13m_{23} = 343 + 169$ siendo: $39 = 26 + 13$

Para el primo 17: $512 = 17 \cdot 30 + 2 = 17m_{14} + (17j_{24} + 2) = 493 + 19$ siendo: $30 = 29 + 1$
 $512 = 17 \cdot 30 + 2 = (17j_{14} + 2) + 17m_{24} = 223 + 289$ siendo: $30 = 13 + 17$

Para el primo 19: $512 = 19 \cdot 26 + 18 = 19m_{15} + (19j_{25} + 18) = 133 + 379$ siendo: $26 = 7 + 19$
 $512 = 19 \cdot 26 + 18 = (19j_{15} + 18) + 19m_{25} = 493 + 19$ siendo: $26 = 25 + 1$

Las 7 parejas de términos de las sucesiones **A-B** que no aparecen en las expresiones anteriores son las que cumplen la conjetura resultando ser ambos términos de cada pareja mayores que $\sqrt{512}$ y menores que 512.

Añadimos la pareja de primos **(13 + 499)** en la que el primer término es un múltiplo de 13 ($13m_{13}$) menor que $\sqrt{512}$.

$$512 = 73 + 439 = 103 + 409 = 163 + 349 = 283 + 229 = 313 + 199 = 373 + 139 = 433 + 79 \quad (\text{También: } 512 = 13 + 499)$$

Se puede comprobar que todos los múltiplos $7m$, $11m$, $13m$, $17m$, $19m, \dots$ de una sucesión **A** o **B** se emparejan con múltiplos o primos de la otra formando parejas múltiplo-múltiplo, múltiplo-primo y primo-múltiplo de acuerdo con el axioma que se ha definido.

Al final, las parejas primo-primo sobrantes son las que cumplen la conjetura. En estas parejas, los dos términos son mayores que \sqrt{x} .

La exposición anterior nos ayuda a entender la relación que hay entre la sucesión **A** y la sucesión **B** de cualquier número par x .

Para apoyar numéricamente los axiomas expuestos, y usando un autómata programable, he obtenido datos sobre las sucesiones **A-B** correspondientes a varios números pares (entre 10^6 y 10^9) y que se pueden consultar a partir de la página 21.

Son los siguientes:

1. Número de múltiplos $7m$, $11m$, $13m$, $17m, \dots$ de cada sucesión (incluye los números compuestos más los primos menores que \sqrt{x}).
2. Número de primos de cada sucesión (solamente los mayores que \sqrt{x}).
3. Número de múltiplos que hay en los términos $(7j + a)$, $(11j + b), \dots$ de cada sucesión (compuestos más primos menores que \sqrt{x}).
4. Número de primos que hay en los términos $(7j + a)$, $(11j + b)$, $(13j + c)$, $(17j + d), \dots$ de cada sucesión (mayores que \sqrt{x}).

9. Demostrando la conjetura.

Usaré como punto de partida la primera parte del último axioma del capítulo anterior.

Todos los múltiplos $7m_{11}$, $11m_{12}$, $13m_{13}$, $17m_{14}$,... (incluidos los primos menores que \sqrt{x} que estén presentes) de la sucesión **A** estarán emparejados, respectivamente, con todos los términos $(7j_{21} + a)$, $(11j_{22} + b)$, $(13j_{23} + c)$, $(17j_{24} + d)$,... de la sucesión **B**.

En este axioma, el concepto de *múltiplo* aplicado a los términos de cada sucesión **A** o **B** incluye los números compuestos y los primos menores que \sqrt{x} que estén presentes. Según esta definición, todos los términos menores que \sqrt{x} de cada sucesión son *múltiplos*.

Paralelamente, e igualmente en este axioma, el concepto de *primo* aplicado a los términos de cada sucesión **A** o **B** se refiere solamente a los primos mayores que \sqrt{x} que estén presentes en la sucesión.

Por esta cuestión, a partir de este punto, en vez de referirme a números compuestos lo haré a números *múltiplos*. Según este concepto, las parejas de términos estarán formadas por múltiplo-múltiplo, múltiplo libre-primo, primo-múltiplo libre y parejas primo-primo.

$\frac{x}{30}$ Número de términos de cada sucesión **A** o **B** para el número par x . (Página 4)

$\pi(x)$ Símbolo^[3] normalmente usado para expresar el número real de primos menores o iguales que x .

Según el teorema de los números primos^[3]: $\pi(x) \sim \frac{x}{\ln(x)}$ siendo $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{\frac{x}{\ln(x)}} = 1$ $\ln(x)$ = logaritmo natural de x

Una mejor aproximación para este teorema viene dada por la integral logarítmica desplazada: $\pi(x) \approx \text{Li}(x) = \int_2^x \frac{dy}{\ln(y)}$

Según estas fórmulas, para todo $x \geq 5$ se cumple $\pi(x) > \sqrt{x}$. Esta desigualdad se hace mayor a medida que aumenta x .

$\pi(ax)$ Símbolo para expresar el número real de primos mayores que \sqrt{x} de la sucesión **A** para el número par x .

$\pi(bx)$ Símbolo para expresar el número real de primos mayores que \sqrt{x} de la sucesión **B** para el número par x .

Para valores grandes de x se puede aceptar: $\pi(ax) \approx \pi(bx) \approx \frac{\pi(x)}{8}$ siendo 8 el número de grupos de primos (página 1).

Para $x = 10^9$ el error máximo de la aproximación anterior es 0,0215 % para el grupo $(30n + 19)$.

$\frac{x}{30} - \pi(ax)$ Número de múltiplos de la sucesión **A** para el número par x . Incluye el número 1 en el grupo $(30n + 1)$.

$\frac{x}{30} - \pi(bx)$ Número de múltiplos de la sucesión **B** para el número par x . Incluye el número 1 en el grupo $(30n + 1)$.

Definiremos como fracción $k(ax)$ de la sucesión **A** o $k(bx)$ de la sucesión **B** la relación entre el número de múltiplos y el número total de términos de la sucesión. Como la densidad de los números primos disminuye a medida que avanzamos en la recta numérica, los valores de $k(ax)$ y $k(bx)$ aumentan gradualmente al aumentar x y tienden a 1 cuando x tiende a infinito.

$$k(ax) = \frac{\frac{x}{30} - \pi(ax)}{\frac{x}{30}} = 1 - \frac{\pi(ax)}{\frac{x}{30}} \quad \text{Para la sucesión A: } k(ax) = 1 - \frac{30\pi(ax)}{x} \quad \text{Para la sucesión B: } k(bx) = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x}$$

La cuestión central de este capítulo es desarrollar una fórmula general para calcular el número de múltiplos que hay en los términos $(7j_{21} + a)$, $(11j_{22} + b)$, $(13j_{23} + c)$, $(17j_{24} + d)$,... de la sucesión **B** y que, cumpliendo el axioma de origen, estarán emparejados con un número igual de los múltiplos $7m_{11}$, $11m_{12}$, $13m_{13}$, $17m_{14}$,... de la sucesión **A**. Conocido este dato, se puede calcular el número de los múltiplos de la sucesión **A** que quedarán libres (y que estarán emparejados con primos de la **B**). Finalmente, los primos restantes de la sucesión **B** estarán emparejados con primos de la **A** determinando el número de parejas que cumplen la conjetura.

Para ello vamos a estudiar los términos $(7j + a)$, $(11j + b)$, $(13j + c)$, $(17j + d)$,... de la sucesión **B** de modo general.

El mismo procedimiento se puede aplicar a los términos de la sucesión **A** si usamos la segunda parte del axioma referido al principio.

Analicemos cómo están distribuidos los números primos entre los términos $(7j + a)$, $(11j + b)$, $(13j + c)$, $(17j + d)$,...

Para ello veamos la relación entre el primo 7 y los 8 grupos de primos sirviendo como ejemplo para cualquier primo mayor que 5.

Veamos cómo son los grupos de múltiplos de 7 ($7m$) y los grupos $(7j + a)$ en general o sea $(7j + 1)$, $(7j + 2)$, $(7j + 3)$, $(7j + 4)$, $(7j + 5)$ y $(7j + 6)$. Considerando que es un axioma, deduzco que serán progresiones aritméticas de módulo 210, $(210 = 7 \cdot 30)$.

En las siguientes expresiones, las 8 progresiones aritméticas de módulo 210 se corresponden, respectivamente, con los 8 grupos de primos de módulo 30. Resalto en **negrita** el número que identifica a cada uno de estos 8 grupos. Siendo $n = 0, 1, 2, 3, 4, \dots, \infty$.

$(210n + 90 + \mathbf{1})$, $(210n + \mathbf{7})$, $(210n + 150 + \mathbf{11})$, $(210n + 120 + \mathbf{13})$, $(210n + 60 + \mathbf{17})$, $(210n + 30 + \mathbf{19})$, $(210n + 180 + \mathbf{23})$ y $(210n + 90 + \mathbf{29})$ son múltiplos de 7 ($7m$). Estos grupos no contienen números primos salvo el 7 en el grupo $(210n + \mathbf{7})$ para $n = 0$.

$(210n + \mathbf{1})$, $(210n + 120 + \mathbf{7})$, $(210n + 60 + \mathbf{11})$, $(210n + 30 + \mathbf{13})$, $(210n + 180 + \mathbf{17})$, $(210n + 150 + \mathbf{19})$, $(210n + 90 + \mathbf{23})$ y $(210n + \mathbf{29})$ son términos $(7j + 1)$.

$(210n + 120 + \mathbf{1})$, $(210n + 30 + \mathbf{7})$, $(210n + 180 + \mathbf{11})$, $(210n + 150 + \mathbf{13})$, $(210n + 90 + \mathbf{17})$, $(210n + 60 + \mathbf{19})$, $(210n + \mathbf{23})$ y $(210n + 120 + \mathbf{29})$ son términos $(7j + 2)$.

$(210n + 30 + \mathbf{1})$, $(210n + 150 + \mathbf{7})$, $(210n + 90 + \mathbf{11})$, $(210n + 60 + \mathbf{13})$, $(210n + \mathbf{17})$, $(210n + 180 + \mathbf{19})$, $(210n + 120 + \mathbf{23})$ y $(210n + 30 + \mathbf{29})$ son términos $(7j + 3)$.

$(210n + 150 + \mathbf{1})$, $(210n + 60 + \mathbf{7})$, $(210n + \mathbf{11})$, $(210n + 180 + \mathbf{13})$, $(210n + 120 + \mathbf{17})$, $(210n + 90 + \mathbf{19})$, $(210n + 30 + \mathbf{23})$ y $(210n + 150 + \mathbf{29})$ son términos $(7j + 4)$.

$(210n + 60 + \mathbf{1})$, $(210n + 180 + \mathbf{7})$, $(210n + 120 + \mathbf{11})$, $(210n + 90 + \mathbf{13})$, $(210n + 30 + \mathbf{17})$, $(210n + \mathbf{19})$, $(210n + 150 + \mathbf{23})$ y $(210n + 60 + \mathbf{29})$ son términos $(7j + 5)$.

$(210n + 180 + \mathbf{1})$, $(210n + 90 + \mathbf{7})$, $(210n + 30 + \mathbf{11})$, $(210n + \mathbf{13})$, $(210n + 150 + \mathbf{17})$, $(210n + 120 + \mathbf{19})$, $(210n + 60 + \mathbf{23})$ y $(210n + 180 + \mathbf{29})$ son términos $(7j + 6)$.

Comprobamos que los grupos de múltiplos de 7 ($7m$) se corresponden con progresiones aritméticas de módulo 210, $(210n + b)$, tales que $\text{mcd}(210, b) = 7$ siendo b menor que 210, múltiplo de 7 y habiendo 8 términos b , uno de cada grupo de primos.

Igualmente comprobamos que los grupos de términos $(7j + 1)$, $(7j + 2)$, $(7j + 3)$, $(7j + 4)$, $(7j + 5)$ y $(7j + 6)$ se corresponden con progresiones aritméticas de módulo 210, $(210n + b)$, tales que $\text{mcd}(210, b) = 1$ siendo b menor que 210, no divisible por 7 y habiendo 48 términos b , 6 de cada grupo de primos.

Finalmente, podemos comprobar que los 56 términos b , $(8 + 48)$, son todos los que hay en los 8 grupos de primos menores que 210.

Aplicando el axioma anterior para todo p (número primo mayor que 5 y menor que \sqrt{x}) se puede afirmar que los grupos de múltiplos de p (pm) se corresponden con progresiones aritméticas de módulo $30p$, $(30pn + b)$, tales que $\text{mcd}(30p, b) = p$ siendo b menor que $30p$, múltiplo de p y habiendo 8 términos b , uno de cada grupo de primos.

Igualmente se puede afirmar que los grupos de términos $(pj + 1)$, $(pj + 2)$, $(pj + 3), \dots, (pj + p - 2)$ y $(pj + p - 1)$ se corresponden con progresiones aritméticas de módulo $30p$, $(30pn + b)$, tales que $\text{mcd}(30p, b) = 1$ siendo b menor que $30p$, no divisible por p y habiendo $8(p - 1)$ términos b , $(p - 1)$ de cada grupo de primos.

Finalmente, se puede afirmar que los $8p$ términos b , $(8 + 8(p - 1))$, son todos los que hay en los 8 grupos de primos menores que $30p$.

Por otro lado, un axioma que se cumple en las sucesiones **A** o **B** es que en cada conjunto de p términos consecutivos hay uno de cada uno de los siguientes grupos: pm , $(pj + 1)$, $(pj + 2)$, $(pj + 3), \dots, (pj + p - 2)$ y $(pj + p - 1)$ (aunque no necesariamente en este orden). Ejemplo:

1	31	61	91	121	151	181	Términos $(30n + 1)$
$(7 \cdot 0 + 1)$	$(7 \cdot 4 + 3)$	$(7 \cdot 8 + 5)$	$7 \cdot 13$	$(7 \cdot 17 + 2)$	$(7 \cdot 21 + 4)$	$(7 \cdot 25 + 6)$	Términos $7m$ y $(7j + a)$

Por lo tanto, y según este axioma, $\frac{1}{p} \frac{x}{30}$ será el número de múltiplos de p (pm) (incluido p si lo hubiera) y, también, el número de términos de cada uno de los grupos $(pj + 1)$, $(pj + 2)$, $(pj + 3), \dots, (pj + p - 2)$ y $(pj + p - 1)$ que hay en cada sucesión **A** o **B**.

Este mismo axioma permite afirmar que estos grupos contienen todos los términos de las sucesiones **A** o **B** del siguiente modo:

1. Grupo pm : contiene todos los múltiplos de p .
2. Grupos $(pj + 1)$, $(pj + 2)$, $(pj + 3), \dots, (pj + p - 1)$: contienen todos los múltiplos (excepto los de p) y los primos mayores que \sqrt{x} .

Según se ha descrito, los grupos $(pj + 1)$, $(pj + 2)$, $(pj + 3), \dots, (pj + p - 2)$ y $(pj + p - 1)$ son progresiones aritméticas de módulo $30p$, $(30pn + b)$, tales que $\text{mcd}(30p, b) = 1$.

Aplicando el teorema de los números primos para progresiones aritméticas^[2], expuesto en la página 1, a estos grupos se llega a la conclusión de que todos ellos tendrán, aproximadamente, la misma cantidad de primos ($\approx \frac{\pi(bx)}{p-1}$ para la sucesión **B**) y, como todos ellos tienen el mismo número de términos, también tendrán, aproximadamente, la misma cantidad de múltiplos.

Del mismo modo, podemos aplicar este teorema a términos que pertenezcan a dos o más grupos. Por ejemplo, los términos que estén, a la vez, en los grupos $(7j + a)$ y $(13j + c)$ se corresponden con progresiones aritméticas de módulo 2730, $(2730 = 7 \cdot 13 \cdot 30)$. En este caso, todos los grupos de una sucesión **A** o **B** que incluyen estos términos (72 grupos resultado de combinar las 6 a con las 12 c)

tendrán, aproximadamente, la misma cantidad de primos y, como todos ellos tienen el mismo número de términos, también tendrán, aproximadamente, la misma cantidad de múltiplos.

Según lo descrito, se deduce que de los $\frac{1}{7} \frac{x}{30}$ términos $(7j + a)$ que hay en la sucesión **B**, $\approx \frac{\pi(bx)}{6}$ serán números primos. El resto de términos serán múltiplos (de primos mayores que 5 excepto del primo 7).

En general, se deduce que de los $\frac{1}{p} \frac{x}{30}$ términos $(pj + h)$ que hay en la sucesión **B**, $\approx \frac{\pi(bx)}{p-1}$ serán números primos. El resto de términos serán múltiplos (de primos mayores que 5 excepto del primo p).

Definiremos como fracción $k(7x)$ de la sucesión **B** la relación entre el número de múltiplos que hay en el conjunto de términos $(7j + a)$ y el número total de estos.

Aplicando lo anterior para todo p (número primo mayor que 5 y menor que \sqrt{x}) definiremos como fracción $k(px)$ de la sucesión **B** la relación entre el número de múltiplos que hay en el conjunto de términos $(pj + h)$ y el número total de estos.

Podemos observar la similitud entre $k(bx)$ y los factores $k(7x), k(11x), k(13x), k(17x), \dots, k(px), \dots$ por lo que sus fórmulas serán parecidas. Usaré \approx en vez de $=$ por la imprecisión en el número de primos que hay en cada grupo.

Usando el mismo procedimiento que para obtener $k(bx)$:

$$k(px) \approx \frac{\frac{1}{p} \frac{x}{30} - \frac{\pi(bx)}{p-1}}{\frac{1}{p} \frac{x}{30}} = 1 - \frac{\frac{\pi(bx)}{p-1}}{\frac{1}{p} \frac{x}{30}} = 1 - \frac{30p\pi(bx)}{(p-1)x} \quad k(px) \approx 1 - \frac{30\pi(bx)}{x} \frac{p}{p-1}$$

Para el primo 7: $k(7x) \approx 1 - \frac{35\pi(bx)}{x}$ Para el primo 11: $k(11x) \approx 1 - \frac{33\pi(bx)}{x}$ Para el primo 31: $k(31x) \approx 1 - \frac{31\pi(bx)}{x}$

Y así sucesivamente hasta el primo anterior a \sqrt{x} .

Si ordenamos estos factores de menor a mayor valor: $k(7x) < k(11x) < k(13x) < k(17x) < \dots < k(997x) < \dots < k(bx)$

En la fórmula para obtener $k(px)$ tenemos que $\lim_{p \rightarrow \infty} \frac{p}{p-1} = 1$ por lo que podemos anotar: $\lim_{p \rightarrow \infty} k(px) = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x} = k(bx)$

Unificaremos todos los factores $k(7x), k(11x), k(13x), \dots, k(px), \dots$ en uno solo, que denominaremos $k(jx)$, y que agrupará a todos ellos.

Aplicando lo descrito, definiremos como fracción $k(jx)$ de la sucesión **B** la relación entre el número de múltiplos que hay en el conjunto de todos los términos $(7j_{21} + a), (11j_{22} + b), (13j_{23} + c), (17j_{24} + d), \dots$ y el número total de estos.

Lógicamente, el valor de $k(jx)$ estará determinado por los valores de los factores $k(px)$ correspondientes a cada uno de los primos desde el 7 hasta el anterior a \sqrt{x} .

Resumiendo lo expuesto: una fracción $k(jx)$ de los términos $(7j_{21} + a), (11j_{22} + b), (13j_{23} + c), (17j_{24} + d), \dots$ de la sucesión **B** serán múltiplos y, cumpliendo el axioma de origen, estarán emparejados con una fracción igual de los múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, 13m_{13}, 17m_{14}, \dots$ de la sucesión **A**.

Expresándolo de un modo sencillo y con carácter general:

Una fracción $k(jx)$ de los múltiplos de la sucesión **A** tendrán, como pareja, un múltiplo de la sucesión **B**.

Recordando el axioma de la página 5 y las fórmulas de la página 8 podemos anotar:

Número de parejas múltiplo-múltiplo = $k(jx)$ (Número de múltiplos sucesión **A**)

Número de múltiplos libres sucesión **A** = $(1 - k(jx))$ (Número de múltiplos sucesión **A**)

Nº real de parejas de primos mayores que \sqrt{x} = $P_{PP(x)} = (\text{Nº de primos mayores que } \sqrt{x} \text{ suces. B}) - (\text{Nº de múltiplos libres suces. A})$

Expresándolo algebraicamente: $P_{PP(x)} = \pi(bx) - (1 - k(jx))\left(\frac{x}{30} - \pi(ax)\right)$

Supongamos que pueda existir un número par suficientemente grande que no cumpla la conjetura. En este caso: $P_{PP(x)} = 0$. $P_{PP(x)}$ no puede ser negativo ya que el número de primos de la sucesión **B** no puede ser menor que el de múltiplos libres de la **A**. Se puede definir un factor, que denominaré $k(0x)$, que sustituyendo a $k(jx)$ en la fórmula anterior dé como resultado $P_{PP(x)} = 0$. Como concepto, $k(0x)$ sería el valor mínimo de $k(jx)$ para el cual la conjetura no se cumpliría.

$$0 = \pi(bx) - (1 - k(0x))\left(\frac{x}{30} - \pi(ax)\right) \quad \pi(bx) = (1 - k(0x))\left(\frac{x}{30} - \pi(ax)\right)$$

Despejando: $k(0x) = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x - 30\pi(ax)}$

Para que la conjetura sea verdadera, $k(jx)$ debe ser mayor que $k(0x)$ para cualquier valor de x .

Recordemos que el valor de $k(jx)$ está determinado por los valores de cada uno de los factores $k(7x), k(11x), k(13x), k(17x), \dots, k(px), \dots$

Para analizar la relación entre los factores $k(jx)$ y $k(0x)$, primero comparemos $k(0x)$ con el factor general $k(px)$.

$$k(0x) = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x - 30\pi(ax)} = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x} \frac{x}{x - 30\pi(ax)} = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x} \frac{1}{1 - \frac{30\pi(ax)}{x}}$$

$$k(px) \approx 1 - \frac{30\pi(bx)}{x} \frac{p}{p-1} = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x} \frac{1}{1 - \frac{1}{p}}$$

Para comparar $k(0x)$ con $k(px)$, simplemente hay que comparar $\frac{30\pi(ax)}{x}$ con $\frac{1}{p}$ que son los términos que diferencian a las dos fórmulas.

Recordemos, página 8, el teorema de los números primos: $\pi(x) \sim \frac{x}{\ln(x)}$ siendo $\pi(x)$ el número real de primos menores o iguales que x .

Tal como he indicado, se puede aceptar que: $\pi(ax) \approx \frac{\pi(x)}{8}$ siendo 8 el número de grupos de primos.

Sustituyendo $\pi(x)$ por su fórmula correspondiente: $\pi(ax) \sim \frac{x}{8\ln(x)}$

La aproximación de esta última fórmula no afecta al resultado final de la comparación entre $k(0x)$ y $k(px)$ que estamos analizando.

Comparar $\frac{30\pi(ax)}{x}$ con $\frac{1}{p}$ Sustituyendo $\pi(ax)$ por su fórmula correspondiente

Comparar $\frac{30x}{8x\ln(x)}$ con $\frac{1}{p}$

Comparar $\frac{3,75}{\ln(x)}$ con $\frac{3,75}{3,75p}$

Comparar $\ln(x)$ con $3,75p$ Aplicando el concepto de logaritmo natural

Comparar x con $e^{3,75p}$ Para potencias de 10: $\ln 10 = 2,302585$ $3,75 / 2,302585 = 1,6286 \approx 1,63$

Comparar x con $10^{1,63p}$

Resultado comparación: $k(0x)$ será menor que $k(px)$ si $x < 10^{1,63p}$ $k(0x)$ será mayor que $k(px)$ si $x > 10^{1,63p}$

En las siguientes expresiones los valores de los exponentes son aproximados. Esto no afecta al resultado de la comparación.

1. Para el primo 7: $k(0x) < k(7x)$ si $x < 10^{11,4}$ $k(0x) > k(7x)$ si $x > 10^{11,4}$ $\approx 4 \cdot 10^4$ primos menores que $10^{5,7}$
2. Para el primo 11: $k(0x) < k(11x)$ si $x < 10^{18}$ $k(0x) > k(11x)$ si $x > 10^{18}$ $\approx 5,08 \cdot 10^7$ primos menores que 10^9
3. Para el primo 31: $k(0x) < k(31x)$ si $x < 10^{50}$ $k(0x) > k(31x)$ si $x > 10^{50}$ $\approx 1,76 \cdot 10^{23}$ primos menores que 10^{25}
4. Para el primo 997: $k(0x) < k(997x)$ si $x < 10^{1620}$ $k(0x) > k(997x)$ si $x > 10^{1620}$ $\approx 5,36 \cdot 10^{806}$ primos menores que 10^{810}

Analizando estos datos se puede comprobar que, para números menores que $10^{11,4}$, $k(0x)$ es menor que todos los factores $k(px)$ y, por lo tanto, también será menor que $k(jx)$ lo que permite asegurar que la conjetura de Goldbach se cumplirá, como mínimo, hasta $10^{11,4}$.

Para valores mayores de x , observamos que $k(0x)$ va superando a los factores $k(px)$ ($k(7x), k(11x), k(13x), k(17x), \dots, k(997x), \dots$).

Observando con detalle comprobamos que si el valor de p , para el que se aplica la comparación, aumenta en modo progresión geométrica, el valor de x a partir del cual $k(0x)$ supera a $k(px)$ aumenta en modo exponencial. Debido a esto, también aumenta en modo exponencial (o ligeramente superior) el número de primos menores que \sqrt{x} y cuyos factores $k(px)$ determinan el valor de $k(jx)$.

Lógicamente, a medida que aumenta el número de primos menores que \sqrt{x} , disminuye el "peso relativo" de cada factor $k(px)$ en relación con el valor de $k(jx)$. Por lo tanto, aunque a partir de $10^{11,4}$ $k(7x)$ sea menor que $k(0x)$, el porcentaje de términos $(7j + a)$ que no estén también en grupos superiores será cada vez menor y el factor $k(7x)$ irá perdiendo influencia en el valor de $k(jx)$.

Lo mismo se puede aplicar a los factores $k(11x), k(13x), k(17x), \dots$ que irán perdiendo influencia sobre $k(jx)$ a medida que aumenta x .

Por otro lado, tomando como ejemplo el primo 997, comprobamos que cuando $k(0x)$ supera a $k(997x)$ ya hay $\approx 5,36 \cdot 10^{806}$ primos con cuyos $k(px)$ (que serán mayores que $k(0x)$) añadidos a los $k(7x)$ a $k(997x)$ (165 factores que serán menores que $k(0x)$) se determinará el valor de $k(jx)$. Nótese la gran diferencia que hay entre 165 y $\approx 5,36 \cdot 10^{806}$.

Estos datos permiten intuir que $k(jx)$ será mayor que $k(0x)$ para cualquier valor de x .

Después de estos datos positivos continuemos el desarrollo de la fórmula que permita calcular el valor aproximado de $k(jx)$.

Para ello comparemos $k(bx)$ con $k(jx)$. Recordemos las definiciones referentes a estos dos factores.

$k(bx)$ = relación entre el número de múltiplos y el número total de términos de la sucesión **B**.

$$\text{Sucesión B} \quad \frac{x}{30} \text{ términos} \quad \pi(bx) \text{ primos} \quad \frac{x}{30} - \pi(bx) \text{ múltiplos} \quad k(bx) = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x}$$

$$\text{Términos sucesión B} \quad 1/7 \text{ son múltiplos de } 7, \quad 1/11 \text{ múltiplos de } 11, \quad 1/13 \text{ múltiplos de } 13, \quad 1/17 \text{ múltiplos de } 17, \dots$$

Y así sucesivamente hasta el primo anterior a \sqrt{x} .

$k(jx)$ = relación entre el número de múltiplos que hay en los términos $(7j_{21} + a)$, $(11j_{22} + b)$, $(13j_{23} + c)$, $(17j_{24} + d)$,... de la sucesión **B** y el número total de estos. Su valor está determinado por los valores de los factores $k(7x)$, $k(11x)$, $k(13x)$, $k(17x)$,...

Tal como se ha descrito al aplicar el teorema de los números primos para progresiones aritméticas, el número real de primos que hay en cada uno de los grupos $(7j_{21} + a)$, $(11j_{22} + b)$, $(13j_{23} + c)$, $(17j_{24} + d)$,... será, aproximadamente, igual al valor medio indicado.

En el caso de que el número par fuera múltiplo de algún primo mayor que 5 (por ejemplo 13), no habría números primos en el grupo $(13j_{23} + c)$ por ser $c = 0$ y el factor $k(13x)$ correspondiente sería igual a 1 lo que, al final, aumentaría ligeramente el valor de $k(jx)$.

$$\text{Grupo } (7j + a) \quad \frac{1}{7} \frac{x}{30} \text{ términos} \quad \approx \frac{\pi(bx)}{6} \text{ primos} \quad \approx \left(\frac{1}{7} \frac{x}{30} - \frac{\pi(bx)}{6} \right) \text{ múltiplos} \quad k(7x) \approx 1 - \frac{30\pi(bx)}{x} \frac{7}{6}$$

$$\text{Términos } (7j + a) \quad \text{No hay múltiplos de } 7, \quad 1/11 \text{ son múltiplos de } 11, \quad 1/13 \text{ múltiplos de } 13, \quad 1/17 \text{ múltiplos de } 17, \dots$$

$$\text{Grupo } (11j + b) \quad \frac{1}{11} \frac{x}{30} \text{ términos} \quad \approx \frac{\pi(bx)}{10} \text{ primos} \quad \approx \left(\frac{1}{11} \frac{x}{30} - \frac{\pi(bx)}{10} \right) \text{ múltiplos} \quad k(11x) \approx 1 - \frac{30\pi(bx)}{x} \frac{11}{10}$$

$$\text{Términos } (11j + b) \quad 1/7 \text{ son múltiplos de } 7, \quad \text{no hay múltiplos de } 11, \quad 1/13 \text{ múltiplos de } 13, \quad 1/17 \text{ múltiplos de } 17, \dots$$

$$\text{Grupo } (13j + c) \quad \frac{1}{13} \frac{x}{30} \text{ términos} \quad \approx \frac{\pi(bx)}{12} \text{ primos} \quad \approx \left(\frac{1}{13} \frac{x}{30} - \frac{\pi(bx)}{12} \right) \text{ múltiplos} \quad k(13x) \approx 1 - \frac{30\pi(bx)}{x} \frac{13}{12}$$

$$\text{Términos } (13j + c) \quad 1/7 \text{ son múltiplos de } 7, \quad 1/11 \text{ múltiplos de } 11, \quad \text{no hay múltiplos de } 13, \quad 1/17 \text{ múltiplos de } 17, \dots$$

$$\text{Grupo } (17j + d) \quad \frac{1}{17} \frac{x}{30} \text{ términos} \quad \approx \frac{\pi(bx)}{16} \text{ primos} \quad \approx \left(\frac{1}{17} \frac{x}{30} - \frac{\pi(bx)}{16} \right) \text{ múltiplos} \quad k(17x) \approx 1 - \frac{30\pi(bx)}{x} \frac{17}{16}$$

$$\text{Términos } (17j + d) \quad 1/7 \text{ son múltiplos de } 7, \quad 1/11 \text{ múltiplos de } 11, \quad 1/13 \text{ múltiplos de } 13, \quad \text{no hay múltiplos de } 17, \dots$$

Y así sucesivamente hasta el primo anterior a \sqrt{x} .

Se puede comprobar que, en cumplimiento del teorema de los números primos para progresiones aritméticas, los grupos $(7j_{21} + a)$, $(11j_{22} + b)$, $(13j_{23} + c)$, $(17j_{24} + d)$,... se comportan con cierta regularidad, definida matemáticamente, respecto al número de términos, de primos y de múltiplos que contienen y que se mantiene con independencia del valor de x .

Siguiendo con el estudio de estos términos veamos algunos datos, obtenidos mediante un autómata programable, referentes al grupo de primos $(30n + 29)$ (escogido como ejemplo) y a los números pares 10^6 , 10^7 , 10^8 y 10^9 .

Aunque para este análisis se puede escoger cualquier secuencia de primos, lo haré en orden ascendente (7, 11, 13, 17, 19, 23, ..., 307). Son los siguientes datos y están contados del siguiente modo:

1. Número total de términos $(7j + a)$, $(11j + b)$, $(13j + c)$, $(17j + d)$,..., $(pj + h)$,...
2. Número de múltiplos en el grupo $(7j + a)$: están todos incluidos.
3. Número de múltiplos en el grupo $(11j + b)$: no están incluidos los que también sean $(7j + a)$.
4. Número de múltiplos en el grupo $(13j + c)$: no están incluidos los que también sean $(7j + a)$ o $(11j + b)$.
5. Número de múltiplos en el grupo $(17j + d)$: no están incluidos los que también sean $(7j + a)$ o $(11j + b)$ o $(13j + c)$.

Y así sucesivamente hasta el grupo del primo 307. Pueden consultarse estos datos a partir de la página 21.

Los porcentajes indicados son en relación con el número total de términos $(7j + a)$, $(11j + b)$, $(13j + c)$, $(17j + d)$, ..., $(pj + h)$, ...

	10^6		10^7		10^8		10^9	
Nº términos $(7j + a)$, $(11j + b)$, ...	23.545		250.287		2.613.173		26.977.564	
Nº múltiplos $(7j + a)$ y %	3.140	13,34 %	33.750	13,48 %	356.077	13,63 %	3.702.786	13,73 %
Nº múltiplos $(11j + b)$ y %	1.767	7,5 %	19.045	7,61 %	199.519	7,63 %	2.067.520	7,66 %
Nº múltiplos $(13j + c)$ y %	1.374	5,84 %	14.714	5,88 %	154.831	5,92 %	1.600.628	5,93 %
Nº múltiplos $(17j + d)$ y %	1.010	4,29 %	10.549	4,21 %	110.081	4,21 %	1.137.457	4,22 %
Total múltiplos grupos 7 a 307	15.008	63,74 %	156.956	62,71 %	1.642.061	62,84 %	17.014.540	63,07 %

Estos nuevos datos nos siguen confirmando que los grupos $(7j_{21} + a)$, $(11j_{22} + b)$, $(13j_{23} + c)$, $(17j_{24} + d)$, ... se comportan de un modo uniforme ya que el porcentaje de múltiplos que suministra cada uno se mantiene prácticamente constante al aumentar x .

La regularidad de estos grupos permite intuir que el valor aproximado de $k(jx)$ se puede obtener mediante una fórmula general.

Teniendo en cuenta los datos de cada grupo, y para desarrollar la fórmula de $k(jx)$, podemos pensar en sumar por un lado el número de términos de todos ellos, por otro el de primos y por último el de múltiplos y efectuar los cálculos con los totales de esas sumas.

Este método no es correcto ya que cada término pueda estar en varios grupos por lo que lo contaríamos varias veces lo que nos daría un resultado final poco fiable. Para resolver esta cuestión de un modo teórico pero más preciso se debería analizar, individualmente y aplicando el principio de inclusión-exclusión, cada uno de los términos $(7j_{21} + a)$, $(11j_{22} + b)$, $(13j_{23} + c)$, $(17j_{24} + d)$, ... para definir los que son múltiplos y los que son primos.

Después de varios intentos, he comprobado que este método analítico es bastante complejo por lo que, al final, lo he desestimado.

Espero y deseo que algún matemático interesado en este tema pueda resolver esta cuestión de un modo riguroso.

Ante la dificultad del análisis matemático, he optado por un método indirecto para obtener la fórmula de $k(jx)$.

Informándome en Internet de las últimas demostraciones de conjeturas matemáticas, he leído que se ha aceptado el uso de ordenadores para efectuar una parte de los cálculos o para verificar las conjeturas hasta un número determinado.

Teniendo en cuenta esta información, he considerado que puedo usar un autómata programable (PLC) para que me ayude a obtener la fórmula de $k(jx)$. Para este fin, he desarrollado los diferentes programas que el autómata necesita para esta labor.

Empezaré analizando los datos expuestos de los cuales se puede deducir:

1. Los conceptos de $k(jx)$ y de $k(bx)$ son similares por lo que sus fórmulas serán parecidas usando ambas las mismas variables.
2. Los parámetros (número de términos, de primos y de múltiplos) que intervienen en $k(jx)$ siguen un "patrón" determinado.
3. Los valores de $k(jx)$ y de $k(bx)$, y también los de $\pi(ax)$ y $\pi(bx)$, aumentarán gradualmente al aumentar x .
4. El valor de $k(jx)$ será menor que el valor de $k(bx)$ (esto puede variar si el número par es múltiplo de primos mayores que 5).
5. Los valores de $k(jx)$ y $k(bx)$ tenderán a igualarse, de una manera asintótica, cuando x tienda a infinito.

Veamos algunos valores, obtenidos mediante el autómata, referentes a $k(bx)$, $k(jx)$ y al grupo $(30n + 29)$ (consultar a partir página 21).

1. Para 10^6	$k(bx) = 0,706447064$	$k(jx) = 0,698577192$	$k(jx) / k(bx) = 0,988859927$
2. Para 10^7	$k(bx) = 0,751107751$	$k(jx) = 0,74568795$	$k(jx) / k(bx) = 0,992784256$
3. Para 10^8	$k(bx) = 0,784035978$	$k(jx) = 0,780284734$	$k(jx) / k(bx) = 0,995215469$
4. Para 10^9	$k(bx) = 0,809322428$	$k(jx) = 0,806541984$	$k(jx) / k(bx) = 0,996564479$
5. Para $7 \cdot 10^6$, (múltiplo de 7)	$k(bx) = 0,744631063$	$k(jx) = 0,755471932$	$k(jx) / k(bx) = 1,014558712$

Analizando estos datos se puede comprobar que, a medida que aumenta x , el valor de $k(jx)$ tiende más rápidamente al valor de $k(bx)$ que el valor de $k(bx)$ con respecto a 1.

Expresándolo numéricamente: Para 10^6 : $(1 - 0,706447064) / (0,706447064 - 0,698577192) = 37,3$
 Para 10^9 : $(1 - 0,809322428) / (0,809322428 - 0,806541984) = 68,57$

A continuación, y partiendo de las fórmulas de $k(bx)$ y $k(0x)$, propondré una para $k(jx)$ con una constante. Para calcular el valor de ésta usaré el autómata.

$$\text{Fórmula de } k(bx): \quad k(bx) = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x} \qquad \text{Fórmula de } k(0x): \quad k(0x) = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x - 30\pi(ax)}$$

$$\text{Fórmula propuesta para } k(jx): \quad k(jx) = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x - c(jx)\pi(ax)}$$

Siendo: x = Número par al que se aplica la conjetura y que define las sucesiones **A-B**.

$\pi(ax)$ = Número real de primos mayores que \sqrt{x} de la sucesión **A** para x .

$\pi(bx)$ = Número real de primos mayores que \sqrt{x} de la sucesión **B** para x .

$k(jx)$ = Factor en estudio. Los datos obtenidos por el autómata permiten calcular su valor para varios números x .

$c(jx)$ = Constante que se puede calcular si conocemos los valores de $\pi(ax)$, $\pi(bx)$ y $k(jx)$ para cada número x .

Recordemos que $k(jx)$ es menor que $k(bx)$ por lo que, comparando las dos fórmulas, se deduce que $c(jx)$ tendría un valor mínimo de 0. Igualmente recordemos que, como concepto, $k(0x)$ sería el valor mínimo de $k(jx)$ para el cual la conjetura no se cumpliría. Según esta afirmación, y comparando la fórmula de $k(jx)$ con la de $k(0x)$, se deduce que $c(jx)$ tendría un valor máximo de 30.

A continuación describo, de un modo simplificado, el programa con el cual trabaja el autómata.

1. Se memorizan los 3.398 primos menores que 31.622. Con ellos podemos analizar las sucesiones **A-B** hasta el número 10^9 .
2. Se divide el número par $x (\leq 10^9)$ por los primos menores que \sqrt{x} . Los restos de estas divisiones son los valores de a, b, c, d, \dots
3. Se divide cada uno de los términos de cada sucesión por los primos menores que \sqrt{x} para definir si son múltiplos o primos.
4. En el mismo proceso se determinan los términos que son de la forma $(7j + a), (11j + b), (13j + c), (17j + d), \dots$ de cada sucesión.
5. Se programan 8 contadores (4 por sucesión) para contar los siguientes datos:
 6. Múltiplos de cada sucesión (incluyen los números compuestos más los primos menores que \sqrt{x}).
 7. Primos de cada sucesión (solamente los mayores que \sqrt{x}).
 8. Múltiplos que hay en los términos $(7j + a), (11j + b), (13j + c), \dots$ de cada sucesión (compuestos más primos menores que \sqrt{x}).
 9. Primos que hay en los términos $(7j + a), (11j + b), (13j + c), (17j + d), \dots$ de cada sucesión (mayores que \sqrt{x}).
10. Con los datos finales de estos contadores, y usando una calculadora, se pueden obtener los valores de $k(ax), k(bx), k(jx), c(jx), \dots$

Seguidamente indico los valores calculados de $c(jx)$ relacionados con algunos números pares (entre 10^6 y 10^9) y con cada grupo de primos. Los detalles de estos cálculos se pueden consultar en los datos numéricos expuestos a partir de la página 21.

	$(30n + 11) + (30n + 29)$		$(30n + 17) + (30n + 23)$	
10^6	2,668	2,668	2,714	2,711
10^7	2,566	2,566	2,371	2,371
10^8	2,371	2,371	2,423	2,423
10^9	2,261	2,261	2,256	2,256

	$(30n + 1) + (30n + 19)$		$(30n + 7) + (30n + 13)$	
$8 \cdot 10^6$	2,697	2,696	2,732	2,732
$8 \cdot 10^7$	2,439	2,439	2,35	2,35

	$(30n + 1) + (30n + 29)$		$(30n + 7) + (30n + 23)$		$(30n + 11) + (30n + 19)$		$(30n + 13) + (30n + 17)$	
$9 \cdot 10^6$	2,744	2,742	2,401	2,4	2,615	2,616	2,603	2,603
$9 \cdot 10^7$	2,309	2,309	2,223	2,223	2,42	2,42	2,474	2,474
$3 \cdot 10^8$	2,308	2,308	2,35	2,35	2,34	2,34	2,288	2,288

	$(30n + 11) + (30n + 23)$				$(30n + 1) + (30n + 7)$		
$4.194.304 = 2^{22}$	2,705	2,705			$8.388.608 = 2^{23}$	2,526	2,523
$67.108.864 = 2^{26}$	2,378	2,378			$134.217.728 = 2^{27}$	2,354	2,354

	$(30n + 17) + (30n + 29)$		$(30n + 23) + (30n + 23)$				$(30n + 13) + (30n + 19)$	
$16.777.216 = 2^{24}$	2,283	2,282			$33.554.432 = 2^{25}$	2,477	2,477	
$268.435.456 = 2^{28}$	2,365	2,365	2,237	2,279	$536.870.912 = 2^{29}$	2,3	2,301	

	$(30n + 11) + (30n + 29)$		$(30n + 17) + (30n + 23)$	
$7 \cdot 10^6$, (múltiplo de 7)	- 5,214	- 5,212	- 5,372	- 5,373

	$(30n + 11) + (30n + 17)$	
$14.872.858 = 2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$	- 30,3	- 30,31

Para obtener valores de $c(jx)$ de números mayores que 10^9 he usado datos reales obtenidos de Wikipedia referentes a la Conjetura de los Primos Gemelos la cual dice: "Existe un número infinito de primos p tales que $p + 2$ también es primo".

Los primos gemelos son aquellas parejas de primos que están separados solo por un número par.

Aplicando a esta conjetura un procedimiento similar al que se ha aplicado a la de Goldbach llegamos al siguiente axioma:

Todos los múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, 13m_{13}, 17m_{14}, \dots$ (incluidos los primos menores que \sqrt{x} que estén presentes) de la sucesión **A** están emparejados, respectivamente, con todos los términos $(7m_{11} + 2), (11m_{12} + 2), (13m_{13} + 2), (17m_{14} + 2), \dots$ de la sucesión **B**.

Según esto, los siguientes valores medios de $c(jx)$ están referidos a los términos $(7m_{11} + 2), (11m_{12} + 2), (13m_{13} + 2), (17m_{14} + 2), \dots$ de la sucesión **B**. Para más detalles consultar los datos numéricos expuestos a partir de la página 32.

10^{10}	$\approx 2,095$	10^{12}	$\approx 2,058$	10^{14}	$\approx 2,029$	10^{16}	$\approx 2,005$
10^{11}	$\approx 2,075$	10^{13}	$\approx 2,042$	10^{15}	$\approx 2,016$	10^{18}	$\approx 1,987$

Consultando los cálculos expuestos desde la página 21 a la 32 podemos comprobar que se cumple el axioma que se ha usado como punto de partida al inicio de este capítulo:

1. El número de múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$ de la sucesión **A** es igual al número de términos $(7j_{21} + a), (11j_{22} + b), \dots$ de la **B**.
2. El número de términos $(7j_{11} + a), (11j_{12} + b), \dots$ de la sucesión **A** es igual al número de múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$ de la **B**.
3. El número de múltiplos que hay en los términos $(7j_{11} + a), (11j_{12} + b), \dots$ de la sucesión **A** coincide con el que hay en los términos $(7j_{21} + a), (11j_{22} + b), \dots$ de la **B** siendo el número de parejas múltiplo-múltiplo que se forman con las dos sucesiones.

Revisemos los datos anteriores:

1. Menor número analizado: 10^6 .
2. Mayor número analizado con el autómata programable: 10^9 .
3. Mayor número analizado con datos obtenidos de Wikipedia: 10^{18} .
4. Mayor valor $c(jx)$: 2,744 para $9 \cdot 10^6$ en la combinación $(30n + 1) + (30n + 29)$.
5. Menor valor $c(jx)$ con el autómata programable: 2,223 para $9 \cdot 10^7$ en la combinación $(30n + 7) + (30n + 23)$.
6. Menor valor $c(jx)$ con datos obtenidos de Wikipedia: 1,987 para 10^{18} (valor medio) (referido a conjetura primos gemelos).
7. Número máximo de términos analizados por el autómata en una sucesión **A** o **B**: 33.333.333 para 10^9 .

De los números analizados con autómata, 10^9 es 10^3 veces mayor que 10^6 . Con datos de Wikipedia, 10^{18} es 10^{12} veces mayor que 10^6 . Se puede observar que, aunque hay una gran diferencia entre los valores de los números analizados, los valores de $c(jx)$ varían muy poco (de 2,744 a 2,223 con autómata y hasta 1,987 con datos de Wikipedia).

Observando con detalle se puede comprobar que para números superiores a $16.777.216 = 2^{24}$, el valor de $c(jx)$ es menor que 2,5. También observamos que el valor medio de $c(jx)$ tiende a disminuir ligeramente al aumentar x .

Finalmente se puede intuir que, para valores grandes de x , el valor medio de $c(jx)$ tenderá a un valor aproximado a 2,3.

Considero que estos datos son suficientemente representativos como para aplicarlos en la fórmula propuesta para $k(jx)$.

Teniendo en cuenta lo anterior se puede definir un valor medio aproximado para $c(jx)$: $c(jx) \approx 2,5$ (para números grandes $c(jx) \approx 2,3$)

Con este valor medio de $c(jx)$ se puede escribir la fórmula definitiva de $k(jx)$: $k(jx) \approx 1 - \frac{30\pi(bx)}{x - 2,5\pi(ax)}$

Considero que esta fórmula es válida para demostrar la conjetura aunque no se haya obtenido mediante análisis matemático.

Igualmente considero que se puede aplicar a números grandes ya que la regularidad en las características de los términos $(7j_{21} + a), (11j_{22} + b), (13j_{23} + c), (17j_{24} + d), \dots$ se mantiene, e intuyo que con mayor precisión, a medida que aumenta x .

También opino que esta fórmula y la que se pueda obtener mediante un método analítico riguroso se pueden considerar equivalentes en cuanto a la validez para demostrar la conjetura aunque los resultados numéricos respectivos puedan no ser exactamente iguales.

Analicemos la desviación que puede afectar al valor medio definido de $c(jx)$. Si tenemos en cuenta solo los números pares que no sean múltiplos de primos mayores que 5, $c(jx)$ tendría un valor mínimo mayor que 0 porque, en este caso, $k(jx)$ siempre es menor que $k(bx)$. Vemos que la desviación máxima posible disminuyendo es desde 2,5 hasta 0 (o próximo a 0). Entiendo que, por simetría, la desviación máxima aumentando será similar por lo que, en principio, el valor de $c(jx)$ siempre sería menor que 5.

Por otro lado, y tal como he indicado, $c(jx)$ tendría un valor máximo de 30. Considerando válida la fórmula propuesta como definitiva para $k(jx)$, considerando que será equivalente a la fórmula analítica y comparando 30 con los valores calculados de $c(jx)$, (entre 2,744 y 2,223), se puede aceptar que siempre se cumplirá que $c(jx) < 30$.

Llegados a este punto, hagamos un resumen de las cuestiones expuestas:

1. Todos los múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$ de la sucesión **A** están emparejados con todos los términos $(7j_{21} + a), (11j_{22} + b), \dots$ de la **B**.
2. Los grupos $(7j_{21} + a), (11j_{22} + b), \dots$ siguen un "patrón" respecto al número de términos, de primos y de múltiplos que contienen.
3. Se define como $k(jx)$ la fracción de los términos $(7j_{21} + a), (11j_{22} + b), (13j_{23} + c), \dots$ de la sucesión **B** que son múltiplos.
4. Lo indicado en el apartado 2 permite intuir que el valor aproximado de $k(jx)$ se puede obtener mediante una fórmula general.
5. Fórmula propuesta para $k(jx)$: $k(jx) = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x - c(jx)\pi(ax)}$. En los cálculos expuestos el valor de $c(jx)$ ha resultado ser menor que 3.
6. Fórmula definitiva para $k(jx)$: $k(jx) \approx 1 - \frac{30\pi(bx)}{x - 2,5\pi(ax)}$. Considero que será equivalente a la fórmula obtenida mediante análisis.
7. Considerando válida la fórmula anterior y teniendo en cuenta los valores calculados de $c(jx)$, (< 3), se puede aceptar que $c(jx) < 30$.
8. Aplicando lo indicado en el apartado anterior: $k(jx) > 1 - \frac{30\pi(bx)}{x - 30\pi(ax)} = k(0x)$
9. Finalmente, y para cualquier valor de x : $k(jx) > k(0x)$. Este punto debe quedar rigurosamente demostrado en la fórmula analítica.

Recordemos, página 10, la fórmula para calcular el número de parejas de primos mayores que \sqrt{x} formadas con las sucesiones **A-B**.

$$P_{PP(x)} = \pi(bx) - (1 - k(jx)) \left(\frac{x}{30} - \pi(ax) \right) \quad \text{Sustituyendo } k(jx) \text{ por su fórmula: } k(jx) = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x - c(jx)\pi(ax)}$$

$$P_{PP(x)} = \pi(bx) - \frac{30\pi(bx)}{x - c(jx)\pi(ax)} \left(\frac{x}{30} - \pi(ax) \right) = \pi(bx) - \frac{x\pi(bx) - 30\pi(ax)\pi(bx)}{x - c(jx)\pi(ax)} = \frac{x\pi(bx) - c(jx)\pi(ax)\pi(bx) - x\pi(bx) + 30\pi(ax)\pi(bx)}{x - c(jx)\pi(ax)}$$

$$P_{PP(x)} = \frac{(30 - c(jx))\pi(ax)\pi(bx)}{x - c(jx)\pi(ax)}$$

Si aplicamos a esta fórmula los valores de $c(jx)$ ya definidos:

$$c(jx) \approx 2,5 \quad P_{PP(x)} \approx \frac{(30 - 2,5)\pi(ax)\pi(bx)}{x - 2,5\pi(ax)} \quad P_{PP(x)} \approx \frac{27,5\pi(ax)\pi(bx)}{x - 2,5\pi(ax)}$$

$$c(jx) < 30 \quad P_{PP(x)} > \frac{(30 - 30)\pi(ax)\pi(bx)}{x - 30\pi(ax)} \quad P_{PP(x)} > 0$$

La expresión final indica que $P_{PP(x)}$ siempre es mayor que 0 y teniendo en cuenta que por su naturaleza, parejas de primos, no puede ser un número fraccionario (debiendo ser mayor que 0 no puede tener un valor entre 0 y 1) deduzco que $P_{PP(x)}$ será un número natural igual o mayor que 1. Igualmente deduzco que el valor de $P_{PP(x)}$ aumentará al aumentar x ya que también aumentan $\pi(ax)$ y $\pi(bx)$.

Podemos anotar:

$$P_{PP(x)} \geq 1 \quad P_{PP(x)} \text{ será un número natural y aumentará al aumentar } x$$

La expresión anterior nos indica que el número de parejas primo-primo mayores que \sqrt{x} que cumplen la conjetura para un número par x siempre es igual o mayor que 1.

Con todo lo descrito, se puede afirmar que: **La Conjetura de Goldbach es verdadera.**

10. Fórmula final.

Considerando ya demostrada la conjetura se puede definir una fórmula para calcular, de un modo aproximado, el número de parejas de primos que suman un número par x .

Según el capítulo anterior, el número de estos pares que se forman con las sucesiones **A-B** mayores que \sqrt{x} y menores que x es:

$$P_{PP(x)} \approx \frac{27,5\pi(ax)\pi(bx)}{x - 2,5\pi(ax)}$$

Si no se exige precisión en la fórmula final, y para valores grandes de x , se puede considerar lo siguiente:

1. En la página 8 he indicado que: $\pi(ax) \approx \pi(bx) \approx \frac{\pi(x)}{8}$ siendo $\pi(x)$ el número real de primos menores o iguales que x .
2. El término $2,5\pi(ax)$ se puede despreciar por ser muy pequeño en comparación con x , (1,59 % de x para 10^9), (0,77 % para 10^{18}).
3. Al aplicar lo anterior aumentará el valor del denominador por lo que, para compensar, en el numerador pondré 28 en vez de 27,5.
4. Los datos expuestos permiten intuir que a medida que x es más grande, el valor medio de $c(jx)$ disminuirá siendo menor que 2,5.
5. El número de posibles parejas de primos con uno de ellos menor que \sqrt{x} es muy pequeño respecto al total de pares de primos.

Teniendo esto en cuenta, se puede modificar ligeramente la fórmula anterior para que resulte más sencilla.

Como concepto final, considero que el resultado de la fórmula obtenida será el número aproximado de parejas de primos que se forman con las sucesiones **A** y **B** y que cumplen la conjetura de Goldbach para un número par x .

$$P_{PP(x)} \approx \frac{28 \frac{\pi(x)}{8} \frac{\pi(x)}{8}}{x} \quad P_{PP(x)} \approx \frac{7 \pi^2(x)}{16 x}$$

Analicemos ahora las sucesiones medias (página 4). En este caso, las sucesiones **A** y **B** proceden del mismo grupo de primos. Recordemos el número 784 usado como ejemplo al principio.

$$784 = 30 \cdot 26 + 4 = (30n_4 + 17) + (30n_5 + 17) \quad \text{siendo: } 26 = n_4 + n_5 + 1$$

Escribiremos la sucesión **A** de todos los números $(30n_4 + 17)$ desde 0 a 784. (La escribimos completa en dos mitades).
Escribiremos también la sucesión **B** de todos los números $(30n_5 + 17)$ desde 784 a 0. (La escribimos completa en dos mitades).

A 17 - 47 - 77 - 107-137-167-197-227-257-287-317-347-377 407-437-~~467~~-497-527-~~557-587-617-647-677~~-707-737-767
B 767-737-707-~~677-647-617-587-557~~-527-497-~~467~~-437-407 377-~~347-317~~-287-~~257-227-197-167-137-107~~ - 77 - 47 - 17

Comprobamos que estas dos sucesiones tienen los mismos términos escritos en orden inverso por lo que las parejas están repetidas. Si les aplicamos el mismo procedimiento que se ha usado para las sucesiones completas comprobaremos que llegamos al mismo resultado. En este caso, el número de parejas de primos distintas que cumplen la conjetura será la mitad del total de pares de primos.

A continuación, y teniendo en cuenta lo descrito para las sucesiones medias, ajustaremos la última fórmula (que usa 2 grupos) al número de grupos de primos usados (3, 6, 4 o 8) en cada número par multiplicando $\frac{7 \pi^2(x)}{16 x}$, respectivamente, por 3/2, 3, 2 o 4.

Efectuando las multiplicaciones descritas y siendo $G(x), \dots$ el número real de particiones de Goldbach para el número par x :

$$G(x) \approx \frac{21 \pi^2(x)}{32 x} \quad \text{Número de particiones para número par no múltiplo de 6 ni de 10.}$$

$$G_6(x) \approx \frac{21 \pi^2(x)}{16 x} \quad \text{Número de particiones para número par múltiplo de 6.}$$

$$G_{10}(x) \approx \frac{7 \pi^2(x)}{8 x} \quad \text{Número de particiones para número par múltiplo de 10.}$$

$$G_{30}(x) \approx \frac{7 \pi^2(x)}{4 x} \quad \text{Número de particiones para número par múltiplo de 30.}$$

Fórmulas finales siendo: $G(x), G_6(x), G_{10}(x), G_{30}(x)$ = Número real de particiones de Goldbach para los números pares x .
 x = Número par mayor que 30.
 $\pi(x)$ = Número real de primos menores o iguales que x .

Aunque se podrían obtener con el autómata, tomaremos los valores reales de $\pi(x)$ de Wikipedia para comprobar la precisión de las fórmulas de $G_{10}(x)$ y de $G(x)$. Aunque solo comprobemos estas dos, considero que la precisión de las cuatro fórmulas será similar.

	$\pi(x)$	$G_{10}(x)$ (autómata)	Resultado fórmula	Diferencia
1. Para 10^6	78.498	5.382	5.392	+ 0,185 %
2. Para 10^7	664.579	38.763	38.646	- 0,302 %
3. Para 10^8	5.761.455	291.281	290.451	- 0,285 %
4. Para 10^9	50.847.534	2.273.918	2.262.288	- 0,511 %
5. Para $2^{28} = 268.435.456$	$\pi(x)$ (autómata) 14.630.810	$G(x)$ (autómata) 525.109	Resultado fórmula 523.319	Diferencia - 0,341 %

Para expresar las fórmulas finales como una función de x usaremos el teorema de los números primos^[3] (página 8): $\pi(x) \sim \frac{x}{\ln(x)}$

Sustituyendo $\pi(x)$ en las fórmulas anteriores y simplificando:

$$G(x) \sim \frac{21 x}{32 \ln^2(x)} \quad \text{Nº de particiones para número par no múltiplo de 6 ni de 10. Para 16.384 fórmula: 114 particiones, real: 151}$$

$$G_6(x) \sim \frac{21 x}{16 \ln^2(x)} \quad \text{Nº de particiones para número par múltiplo de 6. Para 13.122 fórmula: 191 particiones, real: 245}$$

$$G_{10}(x) \sim \frac{7 x}{8 \ln^2(x)} \quad \text{Nº de particiones para número par múltiplo de 10. Para 31.250 fórmula: 255 particiones, real: 326}$$

$$G_{30}(x) \sim \frac{7 x}{4 \ln^2(x)} \quad \text{Nº de particiones para número par múltiplo de 30. Para 21.870 fórmula: 383 particiones, real: 483}$$

El signo \sim indica que estas fórmulas tienen un comportamiento asintótico dando resultados menores que los reales para números pequeños y disminuyendo progresivamente esta diferencia a medida que analizamos números más grandes.

Si el número par es múltiplo de uno o varios primos mayores que 5, y tal como se ha visto en la página 6, se formarán más parejas compuesto-compuesto quedando menos compuestos libres por lo que se formarán más parejas primo-primo.

Debido a esto aumentará la diferencia entre el número real de particiones y el resultado de la fórmula correspondiente.

Ejemplos:

Para 16.016	Resultado fórmula: 112 particiones.	Real: 193 particiones.	Múltiplo de 7, 11 y 13.
Para 16.018	Resultado fórmula: 112 particiones.	Real: 152 particiones.	

Una mejor aproximación para el teorema anterior viene dada por la integral logarítmica desplazada^[3]: $\pi(x) \approx \mathbf{Li}(x) = \int_2^x \frac{dy}{\ln(y)}$

Sustituyendo de nuevo $\pi(x)$ en las fórmulas finales obtenemos unas nuevas más precisas:

$$\mathbf{G}(x) \approx \frac{21}{32} \int_2^x \frac{dy}{\ln^2(y)} \quad \text{Número de particiones para número par no múltiplo de 6 ni de 10.}$$

$$\mathbf{G}_6(x) \approx \frac{21}{16} \int_2^x \frac{dy}{\ln^2(y)} \quad \text{Número de particiones para número par múltiplo de 6.}$$

$$\mathbf{G}_{10}(x) \approx \frac{7}{8} \int_2^x \frac{dy}{\ln^2(y)} \quad \text{Número de particiones para número par múltiplo de 10.}$$

$$\mathbf{G}_{30}(x) \approx \frac{7}{4} \int_2^x \frac{dy}{\ln^2(y)} \quad \text{Número de particiones para número par múltiplo de 30.}$$

11. Comparación con la Conjetura de los Primos Gemelos.

Enunciado de la Conjetura de los Primos Gemelos^[4]: “Existe un número infinito de primos p tales que $p + 2$ también es primo”. Se denominan Primos Gemelos a las parejas de primos que están separados solo por un número par.

La conjetura de Goldbach y la de los primos gemelos son similares ya que ambas se pueden estudiar combinando dos grupos de primos para obtener parejas de primos que sumen un número par, en la primera, o parejas de primos gemelos en la segunda.

Escribamos las tres combinaciones con las cuales se formarán todas las parejas de primos gemelos mayores que 7.

$$(30n_1 + 11) \text{ y } (30n_1 + 13) \quad (30n_2 + 17) \text{ y } (30n_2 + 19) \quad (30n_3 + 29) \text{ y } (30n_3 + 31)$$

Escribiremos las sucesiones **A** y **B** correspondientes al número 780 y a la combinación $(30n_1 + 11)$ y $(30n_1 + 13)$ subrayando las 11 parejas de primos gemelos que se forman.

A 11-41-71-101-131-161-191-221-251-281-311-341-371-401-431-461-491-521-551-581-611-641-671-701-731-761
B 13-43-73-103-133-163-193-223-253-283-313-343-373-403-433-463-493-523-553-583-613-643-673-703-733-763

Una primera diferencia entre estas dos conjeturas se refiere al orden de los términos en las sucesiones **A-B**.

En la de Goldbach están en orden inverso (de menor a mayor en la **A** y de mayor a menor en la **B**) mientras que en la de los primos gemelos los términos de ambas sucesiones están en el mismo orden (de menor a mayor).

Recordemos que la probabilidad de que un número natural sea primo va disminuyendo a medida que aumenta su valor por lo que analizando las sucesiones **A-B** de la conjetura de Goldbach vemos que los dos términos de cada una de las parejas que se forman tienen diferente probabilidad de ser primos ya que uno de ellos tiene un valor entre 0 y $x/2$ y el otro entre $x/2$ y x .

Por otro lado, analizando las sucesiones de la conjetura de los primos gemelos vemos que los dos términos de cada una de las parejas que se forman tienen, prácticamente, la misma probabilidad de ser primos ya que la diferencia entre ellos es de solo dos unidades.

Teniendo en cuenta lo anterior, deduzco que en la conjetura de Goldbach hay una mayor “dificultad” para formar parejas de primos. Tal como se ha visto en la página 6, esta “dificultad” es menor si el número par es múltiplo de uno o varios primos mayores que 5 ya que se forman más parejas compuesto-compuesto quedando menos compuestos libres por lo que se formarán más pares primo-primo.

Una segunda diferencia se refiere a los grupos de términos analizados en cada una de las demostraciones que he desarrollado. En la de Goldbach se analizan los grupos de términos $(7j + a)$, $(11j + b)$, $(13j + c)$, $(17j + d)$,... de la sucesión **B** (o de la **A**). En la de los primos gemelos se analizan los grupos de términos $(7m + 2)$, $(11m + 2)$, $(13m + 2)$, $(17m + 2)$,... de la sucesión **B**. En esta última también se pueden analizar los grupos de términos $(7m - 2)$, $(11m - 2)$, $(13m - 2)$, $(17m - 2)$,... de la sucesión **A**.

Sabemos que los números a, b, c, d, \dots que aparecen en la demostración de la conjetura de Goldbach son los restos de dividir el número par x por los primos desde el 7 hasta el anterior a \sqrt{x} por lo que a, b, c, d, \dots tendrán valores diferentes para cada número par. Si el número par fuera múltiplo (por ejemplo de 7 y de 11) tendríamos que $a = b = 0$.

En el caso de la conjetura de los primos gemelos, podemos decir que $a = b = c = d = \dots = 2$ por lo que los términos analizados siempre tienen la misma configuración. Simplemente aumenta su número a medida que aumenta x .

Debido a esto se puede deducir que, al aumentar x , el comportamiento de los términos $(7m + 2)$, $(11m + 2)$,... de la conjetura de los primos gemelos será más regular que el comportamiento de los términos $(7j + a)$, $(11j + b)$,... de la conjetura de Goldbach.

Una última diferencia estaría relacionada con el número de combinaciones de grupos de primos y el número de éstos que se usan. Recordemos esta cuestión para la conjetura de Goldbach (página 3).

1. Para número par no múltiplo de 6 ni de 10: resultan 2 combinaciones diferentes usando 3 grupos de primos.
2. Para número par múltiplo de 6: resultan 3 combinaciones diferentes usando 6 grupos de primos.
3. Para número par múltiplo de 10: resultan 2 combinaciones diferentes usando 4 grupos de primos.
4. Para número par múltiplo de 30: resultan 4 combinaciones diferentes usando los 8 grupos de primos disponibles.

Para la conjetura de los primos gemelos: resultan 3 combinaciones diferentes usando 6 grupos de primos (siempre los mismos).

Analizando los datos anteriores, deducimos lo siguiente:

1. Para número par no múltiplo de 6 ni de 10: número de particiones es, aproximadamente, la $\frac{1}{2}$ del n° de pares de primos gemelos.
2. Para número par múltiplo de 6: el número de particiones es, aproximadamente, igual al número de pares de primos gemelos.
3. Para número par múltiplo de 10: el número de particiones es, aproximadamente, $\frac{2}{3}$ del número de pares de primos gemelos.
4. Para número par múltiplo de 30: el número de particiones es, aproximadamente, $\frac{4}{3}$ del número de pares de primos gemelos.

Según hemos visto, el número de parejas de primos que suman un número par x (potencia de 2) es: $G(x) \approx \frac{21 \pi^2(x)}{32 x}$

Para número par x múltiplo de 10: $G_{10}(x) \approx \frac{7 \pi^2(x)}{8 x}$

Según la demostración propia, el número de parejas de primos gemelos menores que x es: $G_G(x) \approx \frac{21 \pi^2(x)}{16 x}$

Los siguientes datos para número par (potencia de 2) se han obtenido usando el autómata programable:

Para $268.435.456 = 2^{28}$ 525.109 parejas de primos que suman 2^{28} siendo ambos mayores que 2^{14} .
 1.055.991 parejas de primos gemelos mayores que 2^{14} y menores que 2^{28} .

Para número par múltiplo de 10:

Para 10^9 2.273.918 parejas de primos que suman 10^9 siendo ambos mayores que $10^{4.5}$.
 3.424.019 parejas de primos gemelos mayores que $10^{4.5}$ y menores que 10^9 .

Conjetura Ternaria de Goldbach

La conjetura que se ha estudiado se denomina fuerte o binaria debido a que existe otra, la débil o ternaria, también de Goldbach, que dice lo siguiente^[5]: “Todo número impar mayor que 7 se puede escribir como suma de tres números primos impares”.

En mayo de 2013 el matemático de origen peruano, Harald Andrés Helfgott investigador en el CNRS francés en la École Normale Supérieure de Paris, ha publicado un artículo en la web arXiv.org en el que se demuestra que la conjetura ternaria de Goldbach se cumple para todos los números impares mayores que 10^{29} . Para los números impares menores, y en colaboración con David Platt, se han usado ordenadores para verificar que también la cumplen.

Centrándonos en el presente trabajo, y aceptando ya demostrada la conjetura fuerte de Goldbach, se puede anotar:

$$(\text{Número par} > 4) = (\text{primo impar}) + (\text{primo impar})$$

Sumando el primo 3: $(\text{Número par} > 4) + 3 = (\text{primo impar}) + (\text{primo impar}) + 3$

Por lo tanto, se cumple: $(\text{Impar} > 7) = (\text{primo impar}) + (\text{primo impar}) + (\text{primo impar})$

El trabajo de Harald Helfgott y la expresión anterior nos permiten afirmar que: **La Conjetura Ternaria de Goldbach es verdadera.**

Veamos ahora como calcular el número de representaciones de un número impar mayor que 7 como suma de tres primos impares.

Enunciado del teorema de Hardy-Littlewood^[6]: “Sí la Hipótesis General de Riemann es cierta entonces: $r_3(x) \sim \mathfrak{b}_3(x) \frac{x^2}{\ln^3(x)}$ ”.

En esta fórmula, $r_3(x)$ es el número real de representaciones de un número impar x mayor que 7 como la suma de tres primos impares y $\mathfrak{b}_3(x)$ un factor que depende de x estando su valor comprendido entre dos constantes.

Se puede hacer un razonamiento matemático sencillo para obtener la fórmula del teorema anterior.

Recordemos que $\pi(x) \sim \frac{x}{\ln(x)}$ es el número de primos menores o iguales que x . Siendo $p_1, p_2, p_3, p_4, \dots$ estos primos (empezando por el primer primo impar $p_1 = 3$) y $N_1, N_2, N_3, N_4, \dots$ los números pares que restan a cada primo del impar x tendremos:

$$x = p_1 + N_1 = p_2 + N_2 = p_3 + N_3 = p_4 + N_4 = \dots$$

Y así sucesivamente hasta el último primo que esté a una distancia mayor que 4 de x .

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos deducir que el número real de representaciones $r_3(x)$ será igual a la suma de las particiones de Goldbach $G_{(N_1)}, G_{(N_2)}, G_{(N_3)}, G_{(N_4)}, \dots$ de todos los número pares $N_1, N_2, N_3, N_4, \dots$

$$r_3(x) = G_{(N_1)} + G_{(N_2)} + G_{(N_3)} + G_{(N_4)} + \dots$$

En la expresión anterior el número de sumandos será, aproximadamente, igual al número de primos menores que x .

Recordando las fórmulas para calcular el número de particiones de Goldbach denominaremos $G_m(x) = \mathfrak{b}_3(x) \frac{x}{\ln^2(x)}$ al valor medio de $G_{(N_1)}, G_{(N_2)}, G_{(N_3)}, G_{(N_4)}, \dots$ siendo $\mathfrak{b}_3(x)$ un factor que depende de x . Según lo expuesto podemos escribir:

$$r_3(x) \sim \frac{x}{\ln(x)} \mathfrak{b}_3(x) \frac{x}{\ln^2(x)} \qquad r_3(x) \sim \mathfrak{b}_3(x) \frac{x^2}{\ln^3(x)}$$

Comprobamos que después de un razonamiento “forzado” obtenemos la misma fórmula que la del teorema.

Obtención de datos usando un autómata programable

Recordemos: Múltiplos: incluyen los números compuestos y los primos menores que \sqrt{x} .

Primos: solamente los mayores que \sqrt{x} .

Sucesión A

1. Los cuatro datos resaltados en **negrita** son los obtenidos por el autómata.
2. La suma del número de múltiplos $7m, 11m, \dots$ y del número de primos es el número total de términos de la sucesión.
Debe coincidir con el resultado de la fórmula: $\frac{x}{30}$ (página 4).
3. La suma del número de múltiplos y del número de primos de la forma $(7j + a), (11j + b), \dots$ es el número total de estos términos.
Debe coincidir con el número de múltiplos $7m, 11m, \dots$ de la sucesión **B** (página 6).
4. Se ha usado una calculadora para obtener los siguientes datos:
 5. P_{ppx} = Número de parejas de primos siendo ambos mayores que \sqrt{x} . Debe coincidir con P_{ppx} de la sucesión **B**.
 P_{ppx} = (Número de primos sucesión **A**) – (Número de primos de la forma $(7j + a), (11j + b), \dots$ sucesión **A**)
 6. k_{ax} = Número de múltiplos $7m, 11m, \dots$ dividido por el número total de términos de la sucesión **A**.
 7. k_{jx} = Número de múltiplos que hay en los términos $(7j + a), (11j + b), \dots$ dividido por el número total de estos.
Fórmula propuesta para k_{jx} : $k(jx) = 1 - \frac{30\pi(ax)}{x - c(jx)\pi(bx)}$ (página 13).
 8. c_{jx} = Constante de la fórmula de k_{jx} anterior. Despejando: $c(jx) = \frac{x - \frac{30\pi(ax)}{1 - k(jx)}}{\pi(bx)}$
 9. k_{0x} = Valor mínimo de k_{jx} para el cual la conjetura no se cumpliría: $k(0x) = 1 - \frac{30\pi(ax)}{x - 30\pi(bx)}$ (páginas 10 y 11).

Sucesión B

1. Los cuatro datos resaltados en **negrita** son los obtenidos por el autómata.
2. La suma del número de múltiplos $7m, 11m, \dots$ y del número de primos es el número total de términos de la sucesión.
Debe coincidir con el resultado de la fórmula: $\frac{x}{30}$ (página 4).
3. La suma del número de múltiplos y del número de primos de la forma $(7j + a), (11j + b), \dots$ es el número total de estos términos.
Debe coincidir con el número de múltiplos $7m, 11m, \dots$ de la sucesión **A** (página 6).
4. Se ha usado una calculadora para obtener los siguientes datos:
 5. P_{ppx} = Número de parejas de primos siendo ambos mayores que \sqrt{x} . Debe coincidir con P_{ppx} de la sucesión **A**.
 P_{ppx} = (Número de primos sucesión **B**) – (Número de primos de la forma $(7j + a), (11j + b), \dots$ sucesión **B**)
 6. k_{bx} = Número de múltiplos $7m, 11m, \dots$ dividido por el número total de términos de la sucesión **B**.
 7. k_{jx} = Número de múltiplos que hay en los términos $(7j + a), (11j + b), \dots$ dividido por el número total de estos.
Fórmula propuesta para k_{jx} : $k(jx) = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x - c(jx)\pi(ax)}$ (página 13).
 8. c_{jx} = Constante de la fórmula de k_{jx} anterior. Despejando: $c(jx) = \frac{x - \frac{30\pi(bx)}{1 - k(jx)}}{\pi(ax)}$
 9. k_{0x} = Valor mínimo de k_{jx} para el cual la conjetura no se cumpliría: $k(0x) = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x - 30\pi(ax)}$ (páginas 10 y 11).

Escogiendo el grupo $(30n + 29)$ como ejemplo, contaremos el número de múltiplos que hay en cada uno de los grupos $(7j + a), (11j + b), (13j + c), (17j + d), \dots$ hasta el grupo del primo 307. Los valores obtenidos están resaltados en **negrita**.

Aunque se puede usar cualquier secuencia de primos, y para contar cada término solo una vez, lo haremos en sentido ascendente (del primo 7 hasta el 307).

Múltiplos que hay en los términos $(7j + a)$: están todos incluidos.

Múltiplos que hay en los términos $(11j + b)$: no están incluidos los que también sean términos $(7j + a)$.

Múltiplos que hay en los términos $(13j + c)$: no están incluidos los que también sean términos $(7j + a)$ o $(11j + b)$.

En general términos $(pj + h)$: no están incluidos los que también sean términos de grupos correspondientes a primos menores que p .

Los porcentajes indicados son en relación con el número total de términos $(7j + a), (11j + b), (13j + c), (17j + d), \dots$

$$\underline{10^6} = (30n_1 + 10) = (30n_2 + 11) + (30n_3 + 29) \quad 33.333 \text{ parejas}$$

Primo mayor para dividir 997

Sucesión A (30n₂ + 11)

Sucesión B (30n₃ + 29)

Número total de términos	33.333
Múltiplos 7m, 11m,...	23.545
Primos mayores que 10 ³	9.788
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	23.548
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	16.448
Primos (7j + a), (11j + b),...	7.100

Número total de términos	33.333
Múltiplos 7m, 11m,...	23.548
Primos mayores que 10 ³	9.785
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	23.545
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	16.448
Primos (7j + a), (11j + b),...	7.097

P_{PPx} = Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 10³ P_{PPx} = 9.788 - 7.100 = 9.785 - 7.097 = 2.688
 Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 10³

k_{ax} = 0,70635...
 k_{jx} = 0,698488194
 c_{jx} = 2,668143788
 k_{0x} = 0,584344256

k_{jx} / k_{ax} = 0,988859927
 k_{0x} / k_{ax} = 0,827264688

k_{bx} = 0,70644...
 k_{jx} = 0,698577192
 c_{jx} = 2,668453186
 k_{0x} = 0,58441871

k_{jx} / k_{bx} = 0,988859927
 k_{0x} / k_{bx} = 0,827264687

Múltiplos (7j + a)	3.140	13,336 %	Múltiplos (31j + h)	451	1,915 %	Múltiplos (61j + t)	187	0,794 %
Múltiplos (11j + b)	1.767	7,504 %	Múltiplos (37j + i)	379	1,609 %	Múltiplos (67j + u)	178	0,756 %
Múltiplos (13j + c)	1.374	5,835 %	Múltiplos (41j + l)	327	1,389 %	Múltiplos (71j + v)	158	0,671 %
Múltiplos (17j + d)	1.010	4,289 %	Múltiplos (43j + o)	298	1,265 %	Múltiplos (73j + x)	157	0,666 %
Múltiplos (19j + e)	841	3,572 %	Múltiplos (47j + q)	271	1,151 %	Múltiplos (79j + y)	135	0,573 %
Múltiplos (23j + f)	659	2,799 %	Múltiplos (53j + r)	235	0,998 %	Múltiplos (83j + z)	126	0,535 %
Múltiplos (29j + g)	491	2,085 %	Múltiplos (59j + s)	208	0,883 %			
Grupo primo 89	121	0,514 %	Grupo primo 163	69	0,293 %	Grupo primo 239	49	0,208 %
Grupo primo 97	108	0,459 %	Grupo primo 167	70	0,297 %	Grupo primo 241	54	0,229 %
Grupo primo 101	108	0,459 %	Grupo primo 173	71	0,301 %	Grupo primo 251	47	0,2 %
Grupo primo 103	111	0,471 %	Grupo primo 179	62	0,263 %	Grupo primo 257	48	0,204 %
Grupo primo 107	96	0,408 %	Grupo primo 181	61	0,259 %	Grupo primo 263	43	0,183 %
Grupo primo 109	103	0,437 %	Grupo primo 191	59	0,251 %	Grupo primo 269	41	0,174 %
Grupo primo 113	92	0,391 %	Grupo primo 193	61	0,259 %	Grupo primo 271	43	0,183 %
Grupo primo 127	84	0,357 %	Grupo primo 197	55	0,234 %	Grupo primo 277	43	0,183 %
Grupo primo 131	83	0,352 %	Grupo primo 199	57	0,242 %	Grupo primo 281	40	0,17 %
Grupo primo 137	80	0,34 %	Grupo primo 211	59	0,251 %	Grupo primo 283	38	0,161 %
Grupo primo 139	78	0,331 %	Grupo primo 223	47	0,2 %	Grupo primo 293	42	0,178 %
Grupo primo 149	67	0,284 %	Grupo primo 227	52	0,221 %	Grupo primo 307	35	0,149 %
Grupo primo 151	76	0,323 %	Grupo primo 229	43	0,183 %			
Grupo primo 157	66	0,28 %	Grupo primo 233	54	0,229 %	Total múltiplos grupos 7 a 307	15.008	63,742 %

$$\underline{10^6} = (30n_1 + 10) = (30n_2 + 17) + (30n_3 + 23) \quad 33.333 \text{ parejas}$$

Primo mayor para dividir 997

Sucesión A (30n₂ + 17)

Sucesión B (30n₃ + 23)

Número total de términos	33.333
Múltiplos 7m, 11m,...	23.546
Primos mayores que 10 ³	9.787
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	23.514
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	16.421
Primos (7j + a), (11j + b),...	7.093

Número total de términos	33.333
Múltiplos 7m, 11m,...	23.514
Primos mayores que 10 ³	9.819
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	23.546
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	16.421
Primos (7j + a), (11j + b),...	7.125

P_{PPx} = Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 10³ P_{PPx} = 9.787 - 7.093 = 9.819 - 7.125 = 2.694
 Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 10³

k_{ax} = 0,70638...
 k_{jx} = 0,698349919
 c_{jx} = 2,714499199
 k_{0x} = 0,583785776

k_{jx} / k_{ax} = 0,98862218
 k_{0x} / k_{ax} = 0,826438939

k_{bx} = 0,70542...
 k_{jx} = 0,697400832
 c_{jx} = 2,711148007
 k_{0x} = 0,582992398

k_{jx} / k_{bx} = 0,98862218
 k_{0x} / k_{bx} = 0,826438955

$$\underline{10^7} = (30n_1 + 10) = (30n_2 + 11) + (30n_3 + 29) \quad 333.333 \text{ parejas}$$

Primo mayor para dividir 3.137

Sucesión A (30n₂ + 11)

Sucesión B (30n₃ + 29)

Número total de términos	333.333
Múltiplos 7m, 11m,...	250.287
Primos mayores que 10 ^{3.5}	83.046
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	250.369
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	186.636
Primos (7j + a), (11j + b),...	63.733

Número total de términos	333.333
Múltiplos 7m, 11m,...	250.369
Primos mayores que 10 ^{3.5}	82.964
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	250.287
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	186.636
Primos (7j + a), (11j + b),...	63.651

P_{PPx} = Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 10^{3.5} P_{PPx} = 83.046 - 63.733 = 82.964 - 63.651 = 19.313
 Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 10^{3.5}

$k_{ax} = 0,75086175$			$k_{bx} = 0,751107\dots$		
$k_{jx} = 0,745443725$	$k_{jx} / k_{ax} = 0,992784256$		$k_{jx} = 0,74568795$		$k_{jx} / k_{bx} = 0,992784256$
$c_{jx} = 2,565591768$			$c_{jx} = 2,56636034$		
$k_{0x} = 0,668306022$	$k_{0x} / k_{ax} = 0,890052025$		$k_{0x} = 0,668524975$		$k_{0x} / k_{bx} = 0,890052025$

Múltiplos $(7j + a)$	33.750	13,484 %	Múltiplos $(31j + h)$	4.843	1,935 %	Múltiplos $(61j + t)$	2.095	0,837 %
Múltiplos $(11j + b)$	19.045	7,609 %	Múltiplos $(37j + i)$	3.893	1,555 %	Múltiplos $(67j + u)$	1.862	0,744 %
Múltiplos $(13j + c)$	14.714	5,879 %	Múltiplos $(41j + l)$	3.441	1,375 %	Múltiplos $(71j + v)$	1.730	0,691 %
Múltiplos $(17j + d)$	10.549	4,215 %	Múltiplos $(43j + o)$	3.244	1,296 %	Múltiplos $(73j + x)$	1.680	0,671 %
Múltiplos $(19j + e)$	8.893	3,553 %	Múltiplos $(47j + q)$	2.876	1,149 %	Múltiplos $(79j + y)$	1.520	0,607 %
Múltiplos $(23j + f)$	6.985	2,791 %	Múltiplos $(53j + r)$	2.477	0,99 %	Múltiplos $(83j + z)$	1.425	0,569 %
Múltiplos $(29j + g)$	5.314	2,123 %	Múltiplos $(59j + s)$	2.192	0,876 %			

Grupo primo 89	1.333	0,533 %	Grupo primo 163	623	0,249 %	Grupo primo 239	401	0,16 %
Grupo primo 97	1.197	0,478 %	Grupo primo 167	601	0,24 %	Grupo primo 241	423	0,169 %
Grupo primo 101	1.093	0,437 %	Grupo primo 173	583	0,233 %	Grupo primo 251	379	0,151 %
Grupo primo 103	1.104	0,441 %	Grupo primo 179	537	0,214 %	Grupo primo 257	385	0,154 %
Grupo primo 107	1.035	0,413 %	Grupo primo 181	560	0,224 %	Grupo primo 263	379	0,151 %
Grupo primo 109	987	0,394 %	Grupo primo 191	518	0,207 %	Grupo primo 269	367	0,147 %
Grupo primo 113	960	0,384 %	Grupo primo 193	505	0,202 %	Grupo primo 271	363	0,145 %
Grupo primo 127	848	0,339 %	Grupo primo 197	508	0,203 %	Grupo primo 277	353	0,141 %
Grupo primo 131	789	0,315 %	Grupo primo 199	493	0,2 %	Grupo primo 281	357	0,143 %
Grupo primo 137	767	0,306 %	Grupo primo 211	478	0,197 %	Grupo primo 283	357	0,143 %
Grupo primo 139	726	0,29 %	Grupo primo 223	443	0,177 %	Grupo primo 293	346	0,138 %
Grupo primo 149	687	0,274 %	Grupo primo 227	452	0,181 %	Grupo primo 307	323	0,129 %
Grupo primo 151	679	0,271 %	Grupo primo 229	437	0,175 %			
Grupo primo 157	636	0,254 %	Grupo primo 233	416	0,166 %	Total múltiplos grupos 7 a 307	156.956	62,71 %

$$10^7 = (30n_1 + 10) = (30n_2 + 17) + (30n_3 + 23) \quad 333.333 \text{ parejas}$$

Primo mayor para dividir 3.137

Sucesión A $(30n_2 + 17)$

Sucesión B $(30n_3 + 23)$

Número total de términos	333.333
Múltiplos $7m, 11m, \dots$	250.283
Primos mayores que 3.162	83.050
Número de términos $(7j + a), (11j + b), \dots$	250.238
Múltiplos $(7j + a), (11j + b), \dots$	186.638
Primos $(7j + a), (11j + b), \dots$	63.600

Número total de términos	333.333
Múltiplos $7m, 11m, \dots$	250.238
Primos mayores que 3.162	83.095
Número de términos $(7j + a), (11j + b), \dots$	250.283
Múltiplos $(7j + a), (11j + b), \dots$	186.638
Primos $(7j + a), (11j + b), \dots$	63.645

$$P_{ppx} = \text{Número de parejas de primos siendo ambos mayores que } 10^{3.5} \quad P_{ppx} = 83.050 - 63.600 = 83.095 - 63.645 = 19.450$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que $10^{3.5}$

$k_{ax} = 0,75084975$			$k_{bx} = 0,75071475$		
$k_{jx} = 0,745841958$	$k_{jx} / k_{ax} = 0,9933305$		$k_{jx} = 0,745707858$		$k_{jx} / k_{bx} = 0,9933305$
$c_{jx} = 2,371314813$			$c_{jx} = 2,370922353$		
$k_{0x} = 0,668116395$	$k_{0x} / k_{ax} = 0,8898137$		$k_{0x} = 0,66799627$		$k_{0x} / k_{bx} = 0,8898137$

$$10^8 = (30n_1 + 10) = (30n_2 + 11) + (30n_3 + 29) \quad 3.333.333 \text{ parejas}$$

Primo mayor para dividir 9.973

Sucesión A $(30n_2 + 11)$

Sucesión B $(30n_3 + 29)$

Número total de términos	3.333.333
Múltiplos $7m, 11m, \dots$	2.613.173
Primos mayores que 10^4	720.160
Número de términos $(7j + a), (11j + b), \dots$	2.613.453
Múltiplos $(7j + a), (11j + b), \dots$	2.039.019
Primos $(7j + a), (11j + b), \dots$	574.434

Número total de términos	3.333.333
Múltiplos $7m, 11m, \dots$	2.613.453
Primos mayores que 10^4	719.880
Número de términos $(7j + a), (11j + b), \dots$	2.613.173
Múltiplos $(7j + a), (11j + b), \dots$	2.039.019
Primos $(7j + a), (11j + b), \dots$	574.154

$$P_{ppx} = \text{Número de parejas de primos siendo ambos mayores que } 10^4 \quad P_{ppx} = 720.160 - 574.434 = 719.880 - 574.154 = 145.726$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 10^4

$k_{ax} = 0,7839519\dots$			$k_{bx} = 0,7840359\dots$		
$k_{jx} = 0,780201136$	$k_{jx} / k_{ax} = 0,995215469$		$k_{jx} = 0,780284734$		$k_{jx} / k_{bx} = 0,995215469$
$c_{jx} = 2,370531694$			$c_{jx} = 2,370765683$		
$k_{0x} = 0,724441224$	$k_{0x} / k_{ax} = 0,924088775$		$k_{0x} = 0,724518848$		$k_{0x} / k_{bx} = 0,924088776$

Múltiplos $(7j + a)$	356.077	13,626 %	Múltiplos $(31j + h)$	50.268	1,924 %	Múltiplos $(61j + t)$	21.820	0,835 %
Múltiplos $(11j + b)$	199.519	7,635 %	Múltiplos $(37j + i)$	40.841	1,563 %	Múltiplos $(67j + u)$	19.527	0,747 %
Múltiplos $(13j + c)$	154.831	5,925 %	Múltiplos $(41j + l)$	35.803	1,37 %	Múltiplos $(71j + v)$	18.162	0,695 %
Múltiplos $(17j + d)$	110.081	4,212 %	Múltiplos $(43j + o)$	33.363	1,277 %	Múltiplos $(73j + x)$	17.423	0,667 %
Múltiplos $(19j + e)$	92.988	3,558 %	Múltiplos $(47j + q)$	29.791	1,14 %	Múltiplos $(79j + y)$	15.842	0,606 %
Múltiplos $(23j + f)$	73.084	2,797 %	Múltiplos $(53j + r)$	25.885	0,991 %	Múltiplos $(83j + z)$	14.889	0,57 %
Múltiplos $(29j + g)$	55.555	2,126 %	Múltiplos $(59j + s)$	22.922	0,877 %			

Grupo primo 89	13.782	0,527 %	Grupo primo 163	6.608	0,253 %	Grupo primo 239	4.042	0,155 %
Grupo primo 97	12.476	0,477 %	Grupo primo 167	6.389	0,244 %	Grupo primo 241	4.019	0,154 %
Grupo primo 101	11.884	0,455 %	Grupo primo 173	6.100	0,233 %	Grupo primo 251	3.850	0,147 %
Grupo primo 103	11.554	0,442 %	Grupo primo 179	5.894	0,226 %	Grupo primo 257	3.692	0,141 %
Grupo primo 107	11.022	0,422 %	Grupo primo 181	5.734	0,219 %	Grupo primo 263	3.623	0,139 %
Grupo primo 109	10.684	0,409 %	Grupo primo 191	5.488	0,21 %	Grupo primo 269	3.523	0,135 %
Grupo primo 113	10.163	0,389 %	Grupo primo 193	5.313	0,203 %	Grupo primo 271	3.495	0,134 %
Grupo primo 127	8.942	0,342 %	Grupo primo 197	5.207	0,199 %	Grupo primo 277	3.392	0,13 %
Grupo primo 131	8.636	0,33 %	Grupo primo 199	5.122	0,196 %	Grupo primo 281	3.335	0,128 %
Grupo primo 137	8.227	0,315 %	Grupo primo 211	4.761	0,182 %	Grupo primo 283	3.305	0,126 %
Grupo primo 139	7.968	0,305 %	Grupo primo 223	4.474	0,171 %	Grupo primo 293	3.187	0,122 %
Grupo primo 149	7.392	0,283 %	Grupo primo 227	4.407	0,169 %	Grupo primo 307	3.014	0,115 %
Grupo primo 151	7.240	0,277 %	Grupo primo 229	4.309	0,165 %			
Grupo primo 157	6.897	0,264 %	Grupo primo 233	4.240	0,162 %	Total múltiplos grupos 7 a 307	1.642.061	62,838 %

$$10^8 = (30n_1 + 10) = (30n_2 + 17) + (30n_3 + 23) \quad 3.333.333 \text{ parejas}$$

Primo mayor para dividir 9.973

Sucesión A (30n₂ + 17)

Sucesión B (30n₃ + 23)

Número total de términos	3.333.333
Múltiplos 7m, 11m,...	2.613.261
Primos mayores que 10 ⁴	720.072
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	2.613.125
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	2.038.608
Primos (7j + a), (11j + b),...	574.517

Número total de términos	3.333.333
Múltiplos 7m, 11m,...	2.613.125
Primos mayores que 10 ⁴	720.208
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	2.613.261
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	2.038.608
Primos (7j + a), (11j + b),...	574.653

$$P_{ppx} = \text{Número de parejas de primos siendo ambos mayores que } 10^4 \quad P_{ppx} = 720.072 - 574.517 = 720.208 - 574.653 = 145.555$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 10⁴

$$k_{ax} = 0,7839783\dots$$

$$k_{jx} = 0,780141784$$

$$c_{jx} = 2,42296808$$

$$k_{0x} = 0,724440312$$

$$k_{jx} / k_{ax} = 0,99510625$$

$$k_{0x} / k_{ax} = 0,924056494$$

$$k_{bx} = 0,7839375\dots$$

$$k_{jx} = 0,780101183$$

$$c_{jx} = 2,42285258$$

$$k_{0x} = 0,724402611$$

$$k_{jx} / k_{bx} = 0,99510625$$

$$k_{0x} / k_{bx} = 0,924056495$$

$$10^9 = (30n_1 + 10) = (30n_2 + 11) + (30n_3 + 29) \quad 33.333.333 \text{ parejas} \quad \text{Primo mayor para dividir } 31.607 \quad \text{raíz } 31.622 \quad 50.847.534 \text{ primos menores que } 10^9$$

Sucesión A (30n₂ + 11)

Sucesión B (30n₃ + 29)

Número total de términos	33.333.333
Múltiplos 7m, 11m,...	26.977.564
Primos mayores que 10 ^{4,5}	6.355.769
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	26.977.414
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	21.758.538
Primos (7j + a), (11j + b),...	5.218.876

Número total de términos	33.333.333
Múltiplos 7m, 11m,...	26.977.414
Primos mayores que 10 ^{4,5}	6.355.919
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	26.977.564
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	21.758.538
Primos (7j + a), (11j + b),...	5.219.026

$$P_{ppx} = \text{Número de parejas de primos siendo ambos mayores que } 10^{4,5} \quad P_{ppx} = 6.355.769 - 5.218.876 = 6.355.919 - 5.219.026 = 1.136.893$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 10^{4,5}

$$k_{ax} = 0,809326928$$

$$k_{jx} = 0,806546468$$

$$c_{jx} = 2,261319599$$

$$k_{0x} = 0,76440407$$

$$k_{jx} / k_{ax} = 0,996564479$$

$$k_{0x} / k_{ax} = 0,944493559$$

$$k_{bx} = 0,809322428$$

$$k_{jx} = 0,806541984$$

$$c_{jx} = 2,26130754$$

$$k_{0x} = 0,76439982$$

$$k_{jx} / k_{bx} = 0,996564479$$

$$k_{0x} / k_{bx} = 0,944493559$$

Múltiplos (7j + a)	3.702.786	13,725 %	Múltiplos (31j + h)	517.983	1,92 %	Múltiplos (61j + t)	224.011	0,83 %
Múltiplos (11j + b)	2.067.520	7,664 %	Múltiplos (37j + i)	420.774	1,56 %	Múltiplos (67j + u)	200.865	0,745 %
Múltiplos (13j + c)	1.600.628	5,933 %	Múltiplos (41j + l)	369.785	1,371 %	Múltiplos (71j + v)	186.614	0,692 %
Múltiplos (17j + d)	1.137.457	4,216 %	Múltiplos (43j + o)	344.202	1,276 %	Múltiplos (73j + x)	178.908	0,663 %
Múltiplos (19j + e)	959.914	3,558 %	Múltiplos (47j + q)	307.696	1,141 %	Múltiplos (79j + y)	163.259	0,605 %
Múltiplos (23j + f)	753.704	2,794 %	Múltiplos (53j + r)	267.233	0,991 %	Múltiplos (83j + z)	153.399	0,569 %
Múltiplos (29j + g)	573.050	2,124 %	Múltiplos (59j + s)	235.662	0,874 %			

Grupo primo 89	141.414	0,524 %	Grupo primo 163	68.943	0,256 %	Grupo primo 239	43.564	0,161 %
Grupo primo 97	128.131	0,475 %	Grupo primo 167	66.855	0,248 %	Grupo primo 241	43.153	0,16 %
Grupo primo 101	122.098	0,453 %	Grupo primo 173	64.156	0,238 %	Grupo primo 251	41.212	0,153 %
Grupo primo 103	118.537	0,439 %	Grupo primo 179	61.727	0,229 %	Grupo primo 257	39.983	0,148 %
Grupo primo 107	112.655	0,418 %	Grupo primo 181	60.797	0,225 %	Grupo primo 263	38.915	0,144 %
Grupo primo 109	110.000	0,408 %	Grupo primo 191	57.203	0,212 %	Grupo primo 269	37.905	0,14 %
Grupo primo 113	105.034	0,389 %	Grupo primo 193	56.272	0,209 %	Grupo primo 271	37.475	0,139 %
Grupo primo 127	92.824	0,344 %	Grupo primo 197	54.872	0,203 %	Grupo primo 277	36.498	0,135 %
Grupo primo 131	89.279	0,331 %	Grupo primo 199	54.100	0,2 %	Grupo primo 281	35.761	0,133 %
Grupo primo 137	84.745	0,314 %	Grupo primo 211	50.725	0,188 %	Grupo primo 283	35.390	0,131 %
Grupo primo 139	82.963	0,308 %	Grupo primo 223	47.673	0,177 %	Grupo primo 293	34.012	0,126 %
Grupo primo 149	76.942	0,285 %	Grupo primo 227	46.648	0,173 %	Grupo primo 307	32.328	0,12 %
Grupo primo 151	75.319	0,279 %	Grupo primo 229	46.141	0,171 %			
Grupo primo 157	71.971	0,267 %	Grupo primo 233	44.870	0,166 %	Total múltiplos grupos 7 a 307	17.014.540	63,069 %

$10^9 = (30n_1 + 10) = (30n_2 + 17) + (30n_3 + 23)$ 33.333.333 parejas Primo mayor para dividir 31.607 raíz 31.622 50.847.534 primos menores que 10^9

Sucesión A $(30n_2 + 17)$

Número total de términos	33.333.333
Múltiplos $7m, 11m, \dots$	26.977.923
Primos mayores que $10^{4.5}$	6.355.410
Número de términos $(7j + a), (11j + b), \dots$	26.977.320
Múltiplos $(7j + a), (11j + b), \dots$	21.758.935
Primos $(7j + a), (11j + b), \dots$	5.218.385

Sucesión B $(30n_3 + 23)$

Número total de términos	33.333.333
Múltiplos $7m, 11m, \dots$	26.977.320
Primos mayores que $10^{4.5}$	6.356.013
Número de términos $(7j + a), (11j + b), \dots$	26.977.923
Múltiplos $(7j + a), (11j + b), \dots$	21.758.935
Primos $(7j + a), (11j + b), \dots$	5.218.988

$P_{PPx} =$ Número de parejas de primos siendo ambos mayores que $10^{4.5}$ $P_{PPx} = 6.355.410 - 5.218.385 = 6.356.013 - 5.218.988 = 1.137.025$
 Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que $10^{4.5}$

$k_{ax} = 0,809337698$
 $k_{jx} = 0,806563995$
 $c_{jx} = 2,255995237$
 $k_{0x} = 0,764416557$

$k_{jx} / k_{ax} = 0,996572873$
 $k_{0x} / k_{ax} = 0,944496418$

$k_{bx} = 0,809319608$
 $k_{jx} = 0,806545967$
 $c_{jx} = 2,255948601$
 $k_{0x} = 0,764399471$

$k_{jx} / k_{bx} = 0,996572873$
 $k_{0x} / k_{bx} = 0,944496418$

$8.000.000 = 8 \cdot 10^6 = (30n_1 + 20) = (30n_2 + 1) + (30n_3 + 19)$ 266.667 parejas

Primo mayor para dividir 2.819

Sucesión A $(30n_2 + 1)$

Número total de términos	266.667
Múltiplos $7m, 11m, \dots$	199.312+1
Primos mayores que 2.828	67.354
Número de términos $(7j + a), (11j + b), \dots$	199.314
Múltiplos $(7j + a), (11j + b), \dots$	147.802+1
Primos $(7j + a), (11j + b), \dots$	51.511

Número total de términos	266.667
Múltiplos $7m, 11m, \dots$	199.314
Primos mayores que 2.828	67.353
Número de términos $(7j + a), (11j + b), \dots$	199.312
Múltiplos $(7j + a), (11j + b), \dots$	147.802
Primos $(7j + a), (11j + b), \dots$	51.510

$P_{PPx} =$ Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 2.828 $P_{PPx} = 67.354 - 51.511 = 67.353 - 51.510 = 15.843$
 Faltan las posibles parejas de primos en la que uno de ellos sea menor que 2.828

$k_{ax} = 0,747419065$
 $k_{jx} = 0,741553528$
 $c_{jx} = 2,69727031$
 $k_{0x} = 0,662070338$

$k_{jx} / k_{ax} = 0,992152277$
 $k_{0x} / k_{ax} = 0,885808736$

$k_{bx} = 0,747426565$
 $k_{jx} = 0,741560969$
 $c_{jx} = 2,695611584$
 $k_{0x} = 0,662073659$

$k_{jx} / k_{bx} = 0,992152277$
 $k_{0x} / k_{bx} = 0,88580429$

$8.000.000 = 8 \cdot 10^6 = (30n_1 + 20) = (30n_2 + 7) + (30n_3 + 13)$ 266.667 parejas

Primo mayor para dividir 2.819

Sucesión A $(30n_2 + 7)$

Número total de términos	266.667
Múltiplos $7m, 11m, \dots$	199.224
Primos mayores que 2.828	67.443
Número de términos $(7j + a), (11j + b), \dots$	199.241
Múltiplos $(7j + a), (11j + b), \dots$	147.663
Primos $(7j + a), (11j + b), \dots$	51.578

Número total de términos	266.667
Múltiplos $7m, 11m, \dots$	199.241
Primos mayores que 2.828	67.426
Número de términos $(7j + a), (11j + b), \dots$	199.224
Múltiplos $(7j + a), (11j + b), \dots$	147.663
Primos $(7j + a), (11j + b), \dots$	51.561

$P_{PPx} =$ Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 2.828 $P_{PPx} = 67.443 - 51.578 = 67.426 - 51.561 = 15.865$
 Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 2.828

$k_{ax} = 0,747089066$
 $k_{jx} = 0,741127579$
 $c_{jx} = 2,732174197$
 $k_{0x} = 0,661499827$

$k_{jx} / k_{ax} = 0,992020379$
 $k_{0x} / k_{ax} = 0,885436364$

$k_{bx} = 0,747152816$
 $k_{jx} = 0,74119082$
 $c_{jx} = 2,732386249$
 $k_{0x} = 0,661556274$

$k_{jx} / k_{bx} = 0,992020379$
 $k_{0x} / k_{bx} = 0,885436365$

$80.000.000 = 8 \cdot 10^7 = (30n_1 + 20) = (30n_2 + 1) + (30n_3 + 19)$ 2.666.667 parejas

Primo mayor para dividir 8.941

Sucesión A $(30n_2 + 1)$

Número total de términos	2.666.667
Múltiplos $7m, 11m, \dots$	2.083.272+1
Primos mayores que 8.944	583.394
Número de términos $(7j + a), (11j + b), \dots$	2.083.493
Múltiplos $(7j + a), (11j + b), \dots$	1.619.431+1
Primos $(7j + a), (11j + b), \dots$	464.061

Sucesión B $(30n_3 + 19)$

Número total de términos	2.666.667
Múltiplos $7m, 11m, \dots$	2.083.493
Primos mayores que 8.944	583.174
Número de términos $(7j + a), (11j + b), \dots$	2.083.272
Múltiplos $(7j + a), (11j + b), \dots$	1.619.431
Primos $(7j + a), (11j + b), \dots$	463.841

$P_{PPx} =$ Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 8.944 $P_{PPx} = 583.394 - 464.061 = 583.174 - 463.841 = 119.333$
 Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 8.944

$k_{ax} = 0,781226902$
 $k_{jx} = 0,77726731$
 $c_{jx} = 2,438913946$
 $k_{0x} = 0,719992295$

$k_{jx} / k_{ax} = 0,994931572$
 $k_{0x} / k_{ax} = 0,921617385$

$k_{bx} = 0,781309777$
 $k_{jx} = 0,777349765$
 $c_{jx} = 2,438924811$
 $k_{0x} = 0,720068328$

$k_{jx} / k_{bx} = 0,994931572$
 $k_{0x} / k_{bx} = 0,921616942$

$$80.000.000 = 8 \cdot 10^7 = (30n_1 + 20) = (30n_2 + 7) + (30n_3 + 13) \quad 2.666.667 \text{ parejas} \quad \text{Primo mayor para dividir } 8.941$$

Sucesión A (30n₂ + 7)

Número total de términos	2.666.667
Múltiplos 7m, 11m,...	2.083.064
Primos mayores que 8.944	583.603
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	2.083.030
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	1.619.203
Primos (7j + a), (11j + b),...	463.827

Sucesión B (30n₃ + 13)

Número total de términos	2.666.667
Múltiplos 7m, 11m,...	2.083.030
Primos mayores que 8.944	583.637
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	2.083.064
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	1.619.203
Primos (7j + a), (11j + b),...	463.861

$$P_{PPx} = \text{Número de parejas de primos siendo ambos mayores que } 8.944 \quad P_{PPx} = 583.603 - 463.827 = 583.637 - 463.861 = 119.776$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 8.944

$$k_{ax} = 0,781148902$$

$$k_{jx} = 0,777330619$$

$$c_{jx} = 2,350453759$$

$$k_{0x} = 0,719829722$$

$$k_{jx} / k_{ax} = 0,995111965$$

$$k_{0x} / k_{ax} = 0,921501291$$

$$k_{bx} = 0,781136152$$

$$k_{jx} = 0,777317931$$

$$c_{jx} = 2,350418595$$

$$k_{0x} = 0,719817973$$

$$k_{jx} / k_{bx} = 0,995111965$$

$$k_{0x} / k_{bx} = 0,921501291$$

$$9.000.000 = 9 \cdot 10^6 = (30n_1 + 30) = (30n_2 + 1) + (30n_3 + 29) \quad 300.000 \text{ parejas} \quad \text{Primo mayor para dividir } 2.999$$

Sucesión A (30n₂ + 1)

Número total de términos	300.000
Múltiplos 7m, 11m,...	224.798+1
Primos mayores que 3.000	75.201
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	224.776
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	167.109+1
Primos (7j + a), (11j + b),...	57.666

Sucesión B (30n₃ + 29)

Número total de términos	300.000
Múltiplos 7m, 11m,...	224.776
Primos mayores que 3.000	75.224
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	224.798
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	167.109
Primos (7j + a), (11j + b),...	57.689

$$P_{PPx} = \text{Número de parejas de primos siendo ambos mayores que } 3.000 \quad P_{PPx} = 75.201 - 57.666 = 75.224 - 57.689 = 17.535$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 3.000

$$k_{ax} = 0,749326666$$

$$k_{jx} = 0,743446809$$

$$c_{jx} = 2,743605177$$

$$k_{0x} = 0,66544026$$

$$k_{jx} / k_{ax} = 0,992153145$$

$$k_{0x} / k_{ax} = 0,888050952$$

$$k_{bx} = 0,749253333$$

$$k_{jx} = 0,743374051$$

$$c_{jx} = 2,741843369$$

$$k_{0x} = 0,665372176$$

$$k_{jx} / k_{bx} = 0,992153145$$

$$k_{0x} / k_{bx} = 0,888047001$$

$$9.000.000 = 9 \cdot 10^6 = (30n_1 + 30) = (30n_2 + 7) + (30n_3 + 23) \quad 300.000 \text{ parejas} \quad \text{Primo mayor para dividir } 2.999$$

Sucesión A (30n₂ + 7)

Número total de términos	300.000
Múltiplos 7m, 11m,...	224.761
Primos mayores que 3.000	75.239
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	224.699
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	167.190
Primos (7j + a), (11j + b),...	57.509

Sucesión B (30n₃ + 23)

Número total de términos	300.000
Múltiplos 7m, 11m,...	224.699
Primos mayores que 3.000	75.301
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	224.761
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	167.190
Primos (7j + a), (11j + b),...	57.571

$$P_{PPx} = \text{Número de parejas de primos siendo ambos mayores que } 3.000 \quad P_{PPx} = 75.239 - 57.509 = 75.301 - 57.571 = 17.730$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 3.000

$$k_{ax} = 0,749203333$$

$$k_{jx} = 0,744062056$$

$$c_{jx} = 2,400922383$$

$$k_{0x} = 0,665156498$$

$$k_{jx} / k_{ax} = 0,993137674$$

$$k_{0x} / k_{ax} = 0,887818391$$

$$k_{bx} = 0,748996666$$

$$k_{jx} = 0,743856807$$

$$c_{jx} = 2,400313332$$

$$k_{0x} = 0,664973015$$

$$k_{jx} / k_{bx} = 0,993137674$$

$$k_{0x} / k_{bx} = 0,88781839$$

$$9.000.000 = 9 \cdot 10^6 = (30n_1 + 30) = (30n_2 + 11) + (30n_3 + 19) \quad 300.000 \text{ parejas} \quad \text{Primo mayor para dividir } 2.999$$

Sucesión A (30n₂ + 11)

Número total de términos	300.000
Múltiplos 7m, 11m,...	224.700
Primos mayores que 3.000	75.300
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	224.761
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	167.085
Primos (7j + a), (11j + b),...	57.676

Sucesión B (30n₃ + 19)

Número total de términos	300.000
Múltiplos 7m, 11m,...	224.761
Primos mayores que 3.000	75.239
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	224.700
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	167.085
Primos (7j + a), (11j + b),...	57.615

$$P_{PPx} = \text{Número de parejas de primos siendo ambos mayores que } 3.000 \quad P_{PPx} = 75.300 - 57.676 = 75.239 - 57.615 = 17.624$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 3.000

$$k_{ax} = 0,749$$

$$k_{jx} = 0,743389645$$

$$c_{jx} = 2,615264747$$

$$k_{0x} = 0,664977465$$

$$k_{jx} / k_{ax} = 0,992509539$$

$$k_{0x} / k_{ax} = 0,88782038$$

$$k_{ax} = 0,749203333$$

$$k_{jx} = 0,743591455$$

$$c_{jx} = 2,615912938$$

$$k_{0x} = 0,665157988$$

$$k_{jx} / k_{bx} = 0,992509539$$

$$k_{0x} / k_{bx} = 0,887820379$$

$$9.000.000 = 9 \cdot 10^6 = (30n_1 + 30) = (30n_2 + 13) + (30n_3 + 17) \quad 300.000 \text{ parejas} \quad \text{Primo mayor para dividir } 2.999$$

Sucesión A (30n₂ + 13)

Número total de términos	300.000
Múltiplos 7m, 11m,...	224.749
Primos mayores que 3.000	75.251
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	224.696
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	167.079
Primos (7j + a), (11j + b),...	57.617

Sucesión B (30n₃ + 17)

Número total de términos	300.000
Múltiplos 7m, 11m,...	224.696
Primos mayores que 3.000	75.304
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	224.749
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	167.079
Primos (7j + a), (11j + b),...	57.670

$$P_{PPx} = \text{Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 3.000} \quad P_{PPx} = 75.251 - 57.617 = 75.304 - 57.670 = 17.634$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 3.000

$$k_{ax} = 0,749163333$$

$$k_{jx} = 0,743577989$$

$$c_{jx} = 2,603269404$$

$$k_{0x} = 0,665098622$$

$$k_{jx} / k_{ax} = 0,992544558$$

$$k_{0x} / k_{ax} = 0,88778854$$

$$k_{bx} = 0,748986666$$

$$k_{jx} = 0,74340264$$

$$c_{jx} = 2,602708519$$

$$k_{0x} = 0,664941779$$

$$k_{jx} / k_{bx} = 0,992544558$$

$$k_{0x} / k_{bx} = 0,887788539$$

$$90.000.000 = 9 \cdot 10^7 = (30n_1 + 30) = (30n_2 + 1) + (30n_3 + 29) \quad 3.000.000 \text{ parejas} \quad \text{Primo mayor para dividir } 9.479$$

Sucesión A (30n₂ + 1)

Número total de términos	3.000.000
Múltiplos 7m, 11m,...	2.348.173+1
Primos mayores que 9.486	651.827-1
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	2.347.976
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	1.829.138
Primos (7j + a), (11j + b),...	518.838

Sucesión B (30n₃ + 29)

Número total de términos	3.000.000
Múltiplos 7m, 11m,...	2.347.976
Primos mayores que 9.486	652.024
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	2.348.173
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	1.829.138
Primos (7j + a), (11j + b),...	519.035

$$P_{PPx} = \text{Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 9.486} \quad P_{PPx} = 651.827 - 518.838 = 652.024 - 519.035 = 132.989 \quad (-1)$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 9.486

$$k_{ax} = 0,782724333$$

$$k_{jx} = 0,779027553$$

$$c_{jx} = 2,309215414$$

$$k_{0x} = 0,722387707$$

$$k_{jx} / k_{ax} = 0,995277035$$

$$k_{0x} / k_{ax} = 0,922914589$$

$$k_{bx} = 0,782658666$$

$$k_{jx} = 0,778962197$$

$$c_{jx} = 2,309036271$$

$$k_{0x} = 0,722327102$$

$$k_{jx} / k_{bx} = 0,995277035$$

$$k_{0x} / k_{bx} = 0,922914589$$

$$90.000.000 = 9 \cdot 10^7 = (30n_1 + 30) = (30n_2 + 7) + (30n_3 + 23) \quad 3.000.000 \text{ parejas} \quad \text{Primo mayor para dividir } 9.479$$

Sucesión A (30n₂ + 7)

Número total de términos	3.000.000
Múltiplos 7m, 11m,...	2.348.028
Primos mayores que 9.486	651.972
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	2.347.948
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	1.829.330
Primos (7j + a), (11j + b),...	518.618

Sucesión B (30n₃ + 23)

Número total de términos	3.000.000
Múltiplos 7m, 11m,...	2.347.948
Primos mayores que 9.486	652.052
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	2.348.028
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	1.829.330
Primos (7j + a), (11j + b),...	518.698

$$P_{PPx} = \text{Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 9.486} \quad P_{PPx} = 651.972 - 518.618 = 652.052 - 518.698 = 133.354$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 9.486

$$k_{ax} = 0,782676$$

$$k_{jx} = 0,779118617$$

$$c_{jx} = 2,222960729$$

$$k_{0x} = 0,72232264$$

$$k_{jx} / k_{ax} = 0,995454846$$

$$k_{0x} / k_{ax} = 0,922888449$$

$$k_{bx} = 0,782649333$$

$$k_{jx} = 0,779092072$$

$$c_{jx} = 2,222890318$$

$$k_{0x} = 0,72229803$$

$$k_{jx} / k_{bx} = 0,995454846$$

$$k_{0x} / k_{bx} = 0,922888449$$

$$90.000.000 = 9 \cdot 10^7 = (30n_1 + 30) = (30n_2 + 11) + (30n_3 + 19) \quad 3.000.000 \text{ parejas} \quad \text{Primo mayor para dividir } 9.479$$

Sucesión A (30n₂ + 11)

Número total de términos	3.000.000
Múltiplos 7m, 11m,...	2.347.956
Primos mayores que 9.486	652.044
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	2.348.253
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	1.828.760
Primos (7j + a), (11j + b),...	519.493

Sucesión B (30n₃ + 19)

Número total de términos	3.000.000
Múltiplos 7m, 11m,...	2.348.253
Primos mayores que 9.486	651.747
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	2.347.956
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	1.828.760
Primos (7j + a), (11j + b),...	519.196

$$P_{PPx} = \text{Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 9.486} \quad P_{PPx} = 652.044 - 519.493 = 651.747 - 519.196 = 132.551$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 9.486

$$k_{ax} = 0,782652$$

$$k_{jx} = 0,778774689$$

$$c_{jx} = 2,420244777$$

$$k_{0x} = 0,722328045$$

$$k_{jx} / k_{ax} = 0,995045932$$

$$k_{0x} / k_{ax} = 0,922923655$$

$$k_{bx} = 0,782751$$

$$k_{jx} = 0,778873198$$

$$c_{jx} = 2,420526556$$

$$k_{0x} = 0,722419415$$

$$k_{jx} / k_{bx} = 0,995045932$$

$$k_{0x} / k_{bx} = 0,922923656$$

$$90.000.000 = 9 \cdot 10^7 = (30n_1 + 30) = (30n_2 + 13) + (30n_3 + 17) \quad 3.000.000 \text{ parejas} \quad \text{Primo mayor para dividir } 9.479$$

Sucesión A (30n₂ + 13)

Número total de términos	3.000.000
Múltiplos 7m, 11m,...	2.347.924
Primos mayores que 9.486	652.076
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	2.347.962
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	1.828.299
Primos (7j + a), (11j + b),...	519.663

Sucesión B (30n₃ + 17)

Número total de términos	3.000.000
Múltiplos 7m, 11m,...	2.347.962
Primos mayores que 9.486	652.038
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	2.347.924
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	1.828.299
Primos (7j + a), (11j + b),...	519.625

$$P_{PP_x} = \text{Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 9.486} \quad P_{PP_x} = 652.076 - 519.663 = 652.038 - 519.625 = 132.413$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 9.486

$$k_{ax} = 0,782641333$$

$$k_{jx} = 0,778674867$$

$$c_{jx} = 2,473675008$$

$$k_{0x} = 0,722280002$$

$$k_{jx} / k_{ax} = 0,994931949$$

$$k_{0x} / k_{ax} = 0,922874848$$

$$k_{bx} = 0,782654$$

$$k_{jx} = 0,77868747$$

$$c_{jx} = 2,473711418$$

$$k_{0x} = 0,722291692$$

$$k_{jx} / k_{bx} = 0,994931949$$

$$k_{0x} / k_{bx} = 0,922874848$$

$$300.000.000 = 3 \cdot 10^8 = (30n_1 + 30) = (30n_2 + 1) + (30n_3 + 29) \quad 10^7 \text{ parejas} \quad \text{Primo mayor para dividir } 17.317$$

Sucesión A (30n₂ + 1)

Número total de términos	10.000.000
Múltiplos 7m, 11m,...	7.969.053+1
Primos mayores que 17.320	2.030.946
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	7.968.588
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	6.324.515+1
Primos (7j + a), (11j + b),...	1.644.072

Sucesión B (30n₃ + 29)

Número total de términos	10.000.000
Múltiplos 7m, 11m,...	7.968.588
Primos mayores que 17.320	2.031.412
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	7.969.053
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	6.324.515
Primos (7j + a), (11j + b),...	1.644.538

$$P_{PP_x} = \text{Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 17.320} \quad P_{PP_x} = 2.030.946 - 1.644.072 = 2.031.412 - 1.644.538 = 386.874$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 17.320

$$k_{ax} = 0,7969053$$

$$k_{jx} = 0,793680762$$

$$c_{jx} = 2,308152416$$

$$k_{0x} = 0,745131006$$

$$k_{jx} / k_{ax} = 0,995953675$$

$$k_{0x} / k_{ax} = 0,935030807$$

$$k_{bx} = 0,7968588$$

$$k_{jx} = 0,79363445$$

$$c_{jx} = 2,307957765$$

$$k_{0x} = 0,745087434$$

$$k_{jx} / k_{bx} = 0,995953675$$

$$k_{0x} / k_{bx} = 0,93503069$$

$$300.000.000 = 3 \cdot 10^8 = (30n_1 + 30) = (30n_2 + 7) + (30n_3 + 23) \quad 10^7 \text{ parejas} \quad \text{Primo mayor para dividir } 17.317$$

Sucesión A (30n₂ + 7)

Número total de términos	10.000.000
Múltiplos 7m, 11m,...	7.968.657
Primos mayores que 17.320	2.031.343
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	7.968.695
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	6.323.804
Primos (7j + a), (11j + b),...	1.644.891

Sucesión B (30n₃ + 23)

Número total de términos	10.000.000
Múltiplos 7m, 11m,...	7.968.695
Primos mayores que 17.320	2.031.305
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	7.968.657
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	6.323.804
Primos (7j + a), (11j + b),...	1.644.853

$$P_{PP_x} = \text{Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 17.320} \quad P_{PP_x} = 2.031.343 - 1.644.891 = 2.031.305 - 1.644.853 = 386.452$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 17.320

$$k_{ax} = 0,7968657$$

$$k_{jx} = 0,793580881$$

$$c_{jx} = 2,350215256$$

$$k_{0x} = 0,745084609$$

$$k_{jx} / k_{ax} = 0,995877826$$

$$k_{0x} / k_{ax} = 0,935019049$$

$$k_{bx} = 0,7968695$$

$$k_{jx} = 0,793584665$$

$$c_{jx} = 2,350225822$$

$$k_{0x} = 0,745088162$$

$$k_{jx} / k_{bx} = 0,995877826$$

$$k_{0x} / k_{bx} = 0,935019048$$

$$300.000.000 = 3 \cdot 10^8 = (30n_1 + 30) = (30n_2 + 11) + (30n_3 + 19) \quad 10^7 \text{ parejas} \quad \text{Primo mayor para dividir } 17.317$$

Sucesión A (30n₂ + 11)

Número total de términos	10.000.000
Múltiplos 7m, 11m,...	7.968.686
Primos mayores que 17.320	2.031.314
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	7.968.872
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	6.324.084
Primos (7j + a), (11j + b),...	1.644.788

Sucesión B (30n₃ + 19)

Número total de términos	10.000.000
Múltiplos 7m, 11m,...	7.968.872
Primos mayores que 17.320	2.031.128
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	7.968.686
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	6.324.084
Primos (7j + a), (11j + b),...	1.644.602

$$P_{PP_x} = \text{Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 17.320} \quad P_{PP_x} = 2.031.314 - 1.644.788 = 2.031.128 - 1.644.602 = 386.526$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 17.320

$$k_{ax} = 0,7968686$$

$$k_{jx} = 0,793598391$$

$$c_{jx} = 2,34016453$$

$$k_{0x} = 0,74509391$$

$$k_{jx} / k_{ax} = 0,995896175$$

$$k_{0x} / k_{ax} = 0,935027318$$

$$k_{bx} = 0,7968872$$

$$k_{jx} = 0,793616915$$

$$c_{jx} = 2,340214659$$

$$k_{0x} = 0,745111301$$

$$k_{jx} / k_{bx} = 0,995896175$$

$$k_{0x} / k_{bx} = 0,935027317$$

$$300.000.000 = 3 \cdot 10^8 = (30n_1 + 30) = (30n_2 + 13) + (30n_3 + 17) \quad 10^7 \text{ parejas}$$

Primo mayor para dividir 17.317

Sucesión A (30n₂ + 13)

Sucesión B (30n₃ + 17)

Número total de términos	10.000.000
Múltiplos 7m, 11m,...	7.968.552
Primos mayores que 17.320	2.031.448
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	7.968.561
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	6.324.315
Primos (7j + a), (11j + b),...	1.644.246

Número total de términos	10.000.000
Múltiplos 7m, 11m,...	7.968.561
Primos mayores que 17.320	2.031.439
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	7.968.552
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	6.324.315
Primos (7j + a), (11j + b),...	1.644.237

P_{PPx} = Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 17.320 P_{PPx} = 2.031.448 - 1.644.246 = 2.031.439 - 1.644.237 = 387.202
Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 17.320

$$\begin{aligned} k_{ax} &= 0,7968552 \\ k_{jx} &= 0,793658353 & k_{jx} / k_{ax} &= 0,99598817 \\ c_{jx} &= 2,287981074 \\ k_{0x} &= 0,745067145 & k_{0x} / k_{ax} &= 0,935009453 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_{bx} &= 0,7968561 \\ k_{jx} &= 0,793659249 & k_{jx} / k_{bx} &= 0,99598817 \\ c_{jx} &= 2,287983736 \\ k_{0x} &= 0,745067987 & k_{0x} / k_{bx} &= 0,935009454 \end{aligned}$$

$$2^{22} = 4.194.304 = (30n_1 + 4) = (30n_2 + 11) + (30n_3 + 23) \quad 139.810 \text{ parejas}$$

Primo mayor para dividir 2.039

Sucesión A (30n₂ + 11)

Sucesión B (30n₃ + 23)

Número total de términos	139.810
Múltiplos 7m, 11m,...	102.838
Primos mayores que 2.048	36.972
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	102.841
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	74.981
Primos (7j + a), (11j + b),...	27.860

Número total de términos	139.810
Múltiplos 7m, 11m,...	102.841
Primos mayores que 2.048	36.969
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	102.838
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	74.981
Primos (7j + a), (11j + b),...	27.857

P_{PPx} = Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 2.048 P_{PPx} = 36.972 - 27.860 = 36.969 - 27.857 = 9.112
Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 2.048

$$\begin{aligned} k_{ax} &= 0,735555396 \\ k_{jx} &= 0,729096372 & k_{jx} / k_{ax} &= 0,991218846 \\ c_{jx} &= 2,70514953 \\ k_{0x} &= 0,640494043 & k_{0x} / k_{ax} &= 0,870762482 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_{bx} &= 0,735576854 \\ k_{jx} &= 0,729117641 & k_{jx} / k_{bx} &= 0,991218846 \\ c_{jx} &= 2,705221428 \\ k_{0x} &= 0,640512728 & k_{0x} / k_{bx} &= 0,870762482 \end{aligned}$$

$$2^{23} = 8.388.608 = (30n_1 + 8) = (30n_2 + 1) + (30n_3 + 7) \quad 279.621 \text{ parejas}$$

Primo mayor para dividir 2.887

Sucesión A (30n₂ + 1)

Sucesión B (30n₃ + 7)

Número total de términos	279.621
Múltiplos 7m, 11m,...	209.240+1
Primos mayores que 2.896	70.380
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	209.137
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	155.356+1
Primos (7j + a), (11j + b),...	53.780

Número total de términos	279.621
Múltiplos 7m, 11m,...	209.137
Primos mayores que 2.896	70.484
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	209.240
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	155.356
Primos (7j + a), (11j + b),...	53.884

P_{PPx} = Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 2.896 P_{PPx} = 70.380 - 53.780 = 70.484 - 53.884 = 16.600
Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 2.896

$$\begin{aligned} k_{ax} &= 0,748298589 \\ k_{jx} &= 0,742843208 & k_{jx} / k_{ax} &= 0,992709619 \\ c_{jx} &= 2,526146914 \\ k_{0x} &= 0,663473002 & k_{0x} / k_{ax} &= 0,886642058 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_{bx} &= 0,747930234 \\ k_{jx} &= 0,742477537 & k_{jx} / k_{bx} &= 0,992709619 \\ c_{jx} &= 2,5233892 \\ k_{0x} &= 0,663143231 & k_{0x} / k_{bx} &= 0,886637818 \end{aligned}$$

$$2^{24} = 16.777.216 = (30n_1 + 16) = (30n_2 + 17) + (30n_3 + 29) \quad 559.240 \text{ parejas}$$

Primo mayor para dividir 4.093

Sucesión A (30n₂ + 17)

Sucesión B (30n₃ + 29)

Número total de términos	559.240
Múltiplos 7m, 11m,...	424.629
Primos mayores que 4.096	134.611
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	424.501
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	320.414
Primos (7j + a), (11j + b),...	104.087

Número total de términos	559.240
Múltiplos 7m, 11m,...	424.501
Primos mayores que 4.096	134.739
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	424.629
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	320.414
Primos (7j + a), (11j + b),...	104.215

P_{PPx} = Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 4.096 P_{PPx} = 134.611 - 104.087 = 134.739 - 104.215 = 30.524
Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 4.096

$$\begin{aligned} k_{ax} &= 0,759296545 \\ k_{jx} &= 0,754801519 & k_{jx} / k_{ax} &= 0,994080013 \\ c_{jx} &= 2,282775574 \\ k_{0x} &= 0,682896316 & k_{0x} / k_{ax} &= 0,899380249 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_{bx} &= 0,759067663 \\ k_{jx} &= 0,754573992 & k_{jx} / k_{bx} &= 0,994080013 \\ c_{jx} &= 2,282139908 \\ k_{0x} &= 0,682690464 & k_{0x} / k_{bx} &= 0,899380249 \end{aligned}$$

$$2^{25} = 33.554.432 = (30n_1 + 2) = (30n_2 + 13) + (30n_3 + 19) \quad 1.118.481 \text{ parejas}$$

Primo mayor para dividir 5.791

Sucesión A (30n₂ + 13)

Sucesión B (30n₃ + 19)

Número total de términos	1.118.481
Múltiplos 7m, 11m,...	860.580
Primos mayores que 5.792	257.901
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	860.726
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	658.409
Primos (7j + a), (11j + b),...	202.317

Número total de términos	1.118.481
Múltiplos 7m, 11m,...	860.726
Primos mayores que 5.792	257.755
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	860.580
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	658.409
Primos (7j + a), (11j + b),...	202.171

P_{PPx} = Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 5.792 P_{PPx} = 257.901 – 202.317 = 257.755 – 202.171 = 55.584
 Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 5.792

$$\begin{aligned} k_{ax} &= 0,769418523 \\ k_{jx} &= 0,764946103 & k_{jx} / k_{ax} &= 0,994187272 \\ c_{jx} &= 2,476961963 \\ k_{0x} &= 0,700368084 & k_{0x} / k_{ax} &= 0,910256332 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_{bx} &= 0,769549058 \\ k_{jx} &= 0,765075879 & k_{jx} / k_{bx} &= 0,994187272 \\ c_{jx} &= 2,477347165 \\ k_{0x} &= 0,700486904 & k_{0x} / k_{bx} &= 0,910256332 \end{aligned}$$

$$2^{26} = 67.108.864 = (30n_1 + 4) = (30n_2 + 11) + (30n_3 + 23) \quad 2.236.962 \text{ parejas}$$

Primo mayor para dividir 8.191

Sucesión A (30n₂ + 11)

Sucesión B (30n₃ + 23)

Número total de términos	2.236.962
Múltiplos 7m, 11m,...	1.742.437
Primos mayores que 8.192	494.525
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	1.742.039
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	1.350.052
Primos (7j + a), (11j + b),...	391.987

Número total de términos	2.236.962
Múltiplos 7m, 11m,...	1.742.039
Primos mayores que 8.192	494.923
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	1.742.437
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	1.350.052
Primos (7j + a), (11j + b),...	392.385

P_{PPx} = Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 8.192 P_{PPx} = 494.525 – 391.987 = 494.923 – 392.385 = 102.538
 Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 8.192

$$\begin{aligned} k_{ax} &= 0,778930084 \\ k_{jx} &= 0,774983797 & k_{jx} / k_{ax} &= 0,994933708 \\ c_{jx} &= 2,378037211 \\ k_{0x} &= 0,716122909 & k_{0x} / k_{ax} &= 0,919367377 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_{bx} &= 0,778752164 \\ k_{jx} &= 0,774806779 & k_{jx} / k_{bx} &= 0,994933708 \\ c_{jx} &= 2,377536801 \\ k_{0x} &= 0,715959336 & k_{0x} / k_{bx} &= 0,919367378 \end{aligned}$$

$$2^{27} = 134.217.728 = (30n_1 + 8) = (30n_2 + 1) + (30n_3 + 7) \quad 4.473.925 \text{ parejas}$$

Primo mayor para dividir 11.579

Sucesión A (30n₂ + 1)

Sucesión B (30n₃ + 7)

Número total de términos	4.473.925
Múltiplos 7m, 11m,...	3.523.978+1
Primos mayores que 11.585	949.946
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	3.523.523
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	2.762.690+1
Primos (7j + a), (11j + b),...	760.832

Número total de términos	4.473.925
Múltiplos 7m, 11m,...	3.523.523
Primos mayores que 11.585	950.402
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	3.523.978
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	2.762.690
Primos (7j + a), (11j + b),...	761.288

P_{PPx} = Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 11.585 P_{PPx} = 949.946 – 760.832 = 950.402 – 761.288 = 189.114
 Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 11.585

$$\begin{aligned} k_{ax} &= 0,787670334 \\ k_{jx} &= 0,784070375 & k_{jx} / k_{ax} &= 0,995429611 \\ c_{jx} &= 2,354564853 \\ k_{0x} &= 0,730398752 & k_{0x} / k_{ax} &= 0,927289908 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_{bx} &= 0,787568633 \\ k_{jx} &= 0,783969139 & k_{jx} / k_{bx} &= 0,995429611 \\ c_{jx} &= 2,354141254 \\ k_{0x} &= 0,730304239 & k_{0x} / k_{bx} &= 0,927289645 \end{aligned}$$

$$2^{28} = 268.435.456 = (30n_1 + 16) = (30n_2 + 17) + (30n_3 + 29) \quad 8.947.848 \text{ parejas}$$

Primo mayor para dividir 16.381

Sucesión A (30n₂ + 17)

Sucesión B (30n₃ + 29)

Número total de términos	8.947.848
Múltiplos 7m, 11m,...	7.119.164
Primos mayores que 16.384	1.828.684
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	7.119.276
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	5.640.478
Primos (7j + a), (11j + b),...	1.478.798

Número total de términos	8.947.848
Múltiplos 7m, 11m,...	7.119.276
Primos mayores que 16.384	1.828.572
Número de términos (7j + a), (11j + b),...	7.119.164
Múltiplos (7j + a), (11j + b),...	5.640.478
Primos (7j + a), (11j + b),...	1.478.686

P_{PPx} = Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 16.384 P_{PPx} = 1.828.684 – 1.478.798 = 1.828.572 – 1.478.686 = 349.886
 Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 16.384

$$\begin{aligned} k_{ax} &= 0,795628624 \\ k_{jx} &= 0,792282529 & k_{jx} / k_{ax} &= 0,9957944 \\ c_{jx} &= 2,36480182 \\ k_{0x} &= 0,743136259 & k_{0x} / k_{ax} &= 0,934024035 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_{bx} &= 0,795641141 \\ k_{jx} &= 0,792294994 & k_{jx} / k_{bx} &= 0,9957944 \\ c_{jx} &= 2,364835628 \\ k_{0x} &= 0,74314795 & k_{0x} / k_{bx} &= 0,934024035 \end{aligned}$$

$$\underline{2^{28}} = 268.435.456 = (30n_1 + 16) = (30n_4 + 23) + (30n_5 + 23) \quad 4.473.924 \text{ parejas} \quad \text{Primo mayor para dividir } 16.381$$

Sucesión A (30n₄ + 23) desde 0 a 134.217.728 Sucesión B (30n₅ + 23) desde 134.217.728 a 268.435.456

Número total de términos 4.473.924 Múltiplos 7m, 11m,... 3.523.743 Primos mayores que 16.384 950.181	Número total de términos 4.473.924 Múltiplos 7m, 11m,... 3.595.452 Primos mayores que 16.384 878.472
Número de términos (7j + a), (11j + b),... 3.595.452 Múltiplos (7j + a), (11j + b),... 2.820.494 Primos (7j + a), (11j + b),... 774.958	Número de términos (7j + a), (11j + b),... 3.523.743 Múltiplos (7j + a), (11j + b),... 2.820.494 Primos (7j + a), (11j + b),... 703.249

P_{PPx} = Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 16.384 P_{PPx} = 950.181 - 774.958 = 878.472 - 703.249 = 175.223
 Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 16.384

$k_{ax} = 0,787617983$ $k_{jx} = 0,784461592$ $c_{jx} = 2,237432384$ $k_{0x} = 0,735726988$	$k_{jx} / k_{ax} = 0,995992484$ $k_{0x} / k_{ax} = 0,934116542$	$k_{bx} = 0,803646195$ $k_{jx} = 0,80042557$ $c_{jx} = 2,279504226$ $k_{0x} = 0,750699204$	$k_{jx} / k_{bx} = 0,995992484$ $k_{0x} / k_{bx} = 0,934116541$
--	--	---	--

$$\underline{2^{29}} = 536.870.912 = (30n_1 + 2) = (30n_2 + 13) + (30n_3 + 19) \quad 17.895.697 \text{ parejas} \quad \text{Primo mayor para dividir } 23.167$$

Sucesión A (30n₂ + 13) Sucesión B (30n₃ + 19)

Número total de términos 17.895.697 Múltiplos 7m, 11m,... 14.371.638 Primos mayores que 23.170 3.524.059	Número total de términos 17.895.697 Múltiplos 7m, 11m,... 14.372.432 Primos mayores que 23.170 3.523.265
Número de términos (7j + a), (11j + b),... 14.372.432 Múltiplos (7j + a), (11j + b),... 11.498.803 Primos (7j + a), (11j + b),... 2.873.629	Número de términos (7j + a), (11j + b),... 14.371.638 Múltiplos (7j + a), (11j + b),... 11.498.803 Primos (7j + a), (11j + b),... 2.872.835

P_{PPx} = Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 23.170 P_{PPx} = 3.524.059 - 2.873.629 = 3.523.265 - 2.872.835 = 650.430
 Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 23.170

$k_{ax} = 0,803077857$ $k_{jx} = 0,800059655$ $c_{jx} = 2,300236897$ $k_{0x} = 0,754804268$	$k_{jx} / k_{ax} = 0,996241707$ $k_{0x} / k_{ax} = 0,939889278$	$k_{bx} = 0,803122225$ $k_{jx} = 0,800103857$ $c_{jx} = 2,300353829$ $k_{0x} = 0,754845969$	$k_{jx} / k_{bx} = 0,996241707$ $k_{0x} / k_{bx} = 0,939889278$
--	--	--	--

$$\underline{7.000.000} = 7 \cdot 10^6 = (30n_1 + 10) = (30n_2 + 11) + (30n_3 + 29) \quad 233.333 \text{ parejas} \quad \text{Primo mayor para dividir } 2.633$$

En este caso $a = 0$

Sucesión A (30n₂ + 11) Sucesión B (30n₃ + 29)

Número total de términos 233.333 Múltiplos 7m, 11m,... 173.796 Primos mayores que 2.645 59.537	Número total de términos 233.333 Múltiplos 7m, 11m,... 173.747 Primos mayores que 2.645 59.586
Número de términos (7j + a), (11j + b),... 173.747 Múltiplos (7j + a), (11j + b),... 131.298 Primos (7j + a), (11j + b),... 42.449	Número de términos (7j + a), (11j + b),... 173.796 Múltiplos (7j + a), (11j + b),... 131.298 Primos (7j + a), (11j + b),... 42.498

P_{PPx} = Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 2.645 P_{PPx} = 59.537 - 42.449 = 59.586 - 42.498 = 17.088
 Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 2.645

$k_{ax} = 0,744841064$ $k_{jx} = 0,75568499$ $c_{jx} = -5,214054931$ $k_{0x} = 0,657335748$	$k_{jx} / k_{ax} = 1,014558712$ $k_{0x} / k_{ax} = 0,882518136$	$k_{bx} = 0,744631063$ $k_{jx} = 0,755471932$ $c_{jx} = -5,212329083$ $k_{0x} = 0,657150419$	$k_{jx} / k_{bx} = 1,014558712$ $k_{0x} / k_{bx} = 0,882518136$
--	--	---	--

$$\underline{7.000.000} = 7 \cdot 10^6 = (30n_1 + 10) = (30n_2 + 17) + (30n_3 + 23) \quad 233.333 \text{ parejas} \quad \text{Primo mayor para dividir } 2.633$$

En este caso $a = 0$

Sucesión A (30n₂ + 17) Sucesión B (30n₃ + 23)

Número total de términos 233.333 Múltiplos 7m, 11m,... 173.764 Primos mayores que 2.645 59.569	Número total de términos 233.333 Múltiplos 7m, 11m,... 173.783 Primos mayores que 2.645 59.550
Número de términos (7j + a), (11j + b),... 173.783 Múltiplos (7j + a), (11j + b),... 131.356 Primos (7j + a), (11j + b),... 42.427	Número de términos (7j + a), (11j + b),... 173.764 Múltiplos (7j + a), (11j + b),... 131.356 Primos (7j + a), (11j + b),... 42.408

P_{PPx} = Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 2.645 P_{PPx} = 59.569 - 42.427 = 59.550 - 42.408 = 17.142
 Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 2.645

$k_{ax} = 0,744703921$		$k_{bx} = 0,744785349$	
$k_{jx} = 0,755862196$	$k_{jx} / k_{ax} = 1,014983505$	$k_{jx} = 0,755944844$	$k_{jx} / k_{bx} = 1,014983505$
$c_{jx} = -5,372347613$		$c_{jx} = -5,373039944$	
$k_{0x} = 0,657222595$	$k_{0x} / k_{ax} = 0,882528715$	$k_{0x} = 0,657294458$	$k_{0x} / k_{bx} = 0,882528715$

$$14.872.858 = 2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 = (30n_1 + 28) = (30n_2 + 11) + (30n_3 + 17) \quad 495.762 \text{ parejas} \quad \text{Primo mayor para dividir } 3.853$$

En este caso $a = b = c = d = e = f = 0$

Sucesión A $(30n_2 + 11)$		Sucesión B $(30n_3 + 17)$	
Número total de términos	495.762	Número total de términos	495.762
Múltiplos $7m, 11m, \dots$	375.402	Múltiplos $7m, 11m, \dots$	375.451
Primos mayores que 3.856	120.360	Primos mayores que 3.856	120.311
Número de términos $(7j + a), (11j + b), \dots$	375.451	Número de términos $(7j + a), (11j + b), \dots$	375.402
Múltiplos $(7j + a), (11j + b), \dots$	302.245	Múltiplos $(7j + a), (11j + b), \dots$	302.245
Primos $(7j + a), (11j + b), \dots$	73.206	Primos $(7j + a), (11j + b), \dots$	73.157

$P_{ppx} =$ Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 3.856 $P_{ppx} = 120.360 - 73.206 = 120.311 - 73.157 = 47.154$
 Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 3.856

$k_{ax} = 0,757222215$		$k_{bx} = 0,757321053$	
$k_{jx} = 0,805018497$	$k_{jx} / k_{ax} = 1,063120549$	$k_{jx} = 0,805123574$	$k_{jx} / k_{bx} = 1,063120549$
$c_{jx} = -30,30331135$		$c_{jx} = -30,31126361$	
$k_{0x} = 0,679425487$	$k_{0x} / k_{ax} = 0,897260372$	$k_{0x} = 0,67951417$	$k_{0x} / k_{bx} = 0,897260372$

El autómata usado es muy lento para usarlo en cálculos con números mayores que 10^9 .

Para conocer el valor aproximado de c_{jx} para números superiores usaremos datos de Internet referentes a la Conjetura de los Primos Gemelos.

Enunciado de la Conjetura de los Primos Gemelos: "Existe un número infinito de primos p tales que $(p + 2)$ también es primo".

Primos gemelos son aquellos que están separados solo por un número par. Para generar parejas de primos gemelos se usan las siguientes combinaciones de grupos de números primos: $(30n_1 + 11)$ y $(30n_1 + 13)$, $(30n_2 + 17)$ y $(30n_2 + 19)$, $(30n_3 + 29)$ y $(30n_3 + 31)$

Podemos comprobar que la Conjetura de Goldbach y la Conjetura de los Primos Gemelos son muy similares ya que ambas se pueden estudiar combinando dos grupos de primos para obtener parejas de primos que sumen un número par, en la primera, o parejas de primos gemelos en la segunda.

Teniendo esto en cuenta, se puede usar los datos (*) de Wikipedia referentes al número de primos y al de pares de primos gemelos inferiores a un número dado.

$$10^{10} \quad 455.052.511^* \text{ primos} \quad 27.412.679^* \text{ pares de primos gemelos}$$

Número de términos en cada sucesión A o B :	$10^{10} / 30 = 333.333.333$		
Número aproximado de primos en cada sucesión A o B :	$455.052.511 / 8 = 56.881.563$	(1)	
Número aproximado de pares de primos gemelos en las sucesiones A-B (1 combinación de 3):	$27.412.679 / 3 = 9.137.559$		
Número aproximado de múltiplos $7m, 11m, \dots$	$333.333.333 - 56.881.563 = 276.451.770$	(2)	
Número de términos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$ es, aproximadamente, igual a número de múltiplos $7m, 11m, \dots$			
Número aproximado de primos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$56.881.563 - 9.137.559 = 47.744.004$	(3)	
Número aproximado de múltiplos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$276.451.770 - 47.744.004 = 228.707.766$	(4)	

Número total de términos sucesión B	333.333.333		
Múltiplos $7m, 11m, \dots$	$\approx 276.451.770$	(2)	$k_{bx} \approx 0,82935531$
Primos mayores que 10^5	$\approx 56.881.563$	(1)	$k_{jx} \approx 0,827297166$
Número de términos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$\approx 276.451.770$	(2)	$c_{jx} \approx 2,095100568$
Múltiplos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$\approx 228.707.766$	(4)	$k_{0x} \approx 0,794244171$
Primos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$\approx 47.744.004$	(3)	$k_{7x} \approx 0,800914529$
			$k_{jx} / k_{bx} \approx 0,99751838$
			$k_{0x} / k_{bx} \approx 0,957664539$

$$10^{11} \quad 4.118.054.813^* \text{ primos} \quad 224.376.048^* \text{ pares de primos gemelos}$$

Número de términos en cada sucesión A o B :	$10^{11} / 30 = 3.333.333.333$		
Número aproximado de primos en cada sucesión A o B :	$4.118.054.813 / 8 = 514.756.851$	(1)	
Número aproximado de pares de primos gemelos en las sucesiones A-B (1 combinación de 3):	$224.376.048 / 3 = 74.792.016$		
Número aproximado de múltiplos $7m, 11m, \dots$	$3.333.333.333 - 514.756.851 = 2.818.576.482$	(2)	
Número de términos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$ es, aproximadamente, igual a número de múltiplos $7m, 11m, \dots$			
Número aproximado de primos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$514.756.851 - 74.792.016 = 439.964.835$	(3)	
Número aproximado de múltiplos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$2.818.576.482 - 439.964.835 = 2.378.611.647$	(4)	

Número total de términos sucesión B	3.333.333.333		
Múltiplos $7m, 11m, \dots$	$\approx 2.818.576.482$	(2)	$k_{bx} \approx 0,845572944$
Primos mayores que $10^{5.5}$	$\approx 514.756.851$	(1)	$k_{jx} \approx 0,843905305$
Número de términos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$\approx 2.818.576.482$	(2)	$c_{jx} \approx 2,075447865$
Múltiplos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$\approx 2.378.611.647$	(4)	$k_{0x} \approx 0,817369919$
Primos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$\approx 439.964.835$	(3)	$k_{7x} \approx 0,819835102$
			$k_{jx} / k_{bx} \approx 0,998027799$
			$k_{0x} / k_{bx} \approx 0,966646254$

10^{12}

37.607.912.018* primos

1.870.585.220* pares de primos gemelos

Número de términos en cada sucesión A o B:	$10^{12} / 30 = 33.333.333.333$			
Número aproximado de primos en cada sucesión A o B:	$37.607.912.018 / 8 = 4.700.989.002$	(1)		
Número aproximado de pares de primos gemelos en las sucesiones A-B (1 combinación de 3):	$1.870.585.220 / 3 = 623.528.406$			
Número aproximado de múltiplos $7m, 11m, \dots$	$33.333.333.333 - 4.700.989.002 = 28.632.344.331$	(2)		
Número de términos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$ es, aproximadamente, igual a número de múltiplos $7m, 11m, \dots$				
Número aproximado de primos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$4.700.989.002 - 623.528.406 = 4.077.460.596$	(3)		
Número aproximado de múltiplos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$28.632.344.331 - 4.077.460.596 = 24.554.883.735$	(4)		
Número total de términos sucesión B	33.333.333.333		$k_{bx} \approx 0,85897033$	
Múltiplos $7m, 11m, \dots$	$\approx 28.632.344.331$	(2)	$k_{jx} \approx 0,857592499$	$k_{jx} / k_{bx} \approx 0,99839595$
Primos mayores que 10^6	$\approx 4.700.989.002$	(1)	$c_{jx} \approx 2,058134681$	
Número de términos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$\approx 28.632.344.331$	(2)	$k_{0x} \approx 0,835815434$	$k_{0x} / k_{bx} \approx 0,973043427$
Múltiplos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$\approx 24.554.883.735$	(4)	$k_{7x} \approx 0,835465384$	
Primos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$\approx 4.077.460.596$	(3)	$k_{11x} \approx 0,844867362$	

 10^{13}

346.065.536.839* primos

15.834.664.872* pares de primos gemelos

Número de términos en cada sucesión A o B:	$10^{13} / 30 = 333.333.333.333$			
Número aproximado de primos en cada sucesión A o B:	$346.065.536.839 / 8 = 43.258.192.105$	(1)		
Número aproximado de pares de primos gemelos en las sucesiones A-B (1 combinación de 3):	$15.834.664.872 / 3 = 5.278.221.624$			
Número aproximado de múltiplos $7m, 11m, \dots$	$333.333.333.333 - 43.258.192.105 = 290.075.141.228$	(2)		
Número de términos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$ es, aproximadamente, igual a número de múltiplos $7m, 11m, \dots$				
Número aproximado de primos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$43.258.192.105 - 5.278.221.624 = 37.979.970.481$	(3)		
Número aproximado de múltiplos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$290.075.141.228 - 37.979.970.481 = 252.095.170.747$	(4)		
Número total de términos sucesión B	333.333.333.333		$k_{bx} \approx 0,870225423$	
Múltiplos $7m, 11m, \dots$	$\approx 290.075.141.228$	(2)	$k_{jx} \approx 0,869068509$	$k_{jx} / k_{bx} \approx 0,998670559$
Primos mayores que $10^{6.5}$	$\approx 43.258.192.105$	(1)	$c_{jx} \approx 2,042626025$	
Número de términos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$\approx 290.075.141.228$	(2)	$k_{0x} \approx 0,85087246$	$k_{0x} / k_{bx} \approx 0,977760977$
Múltiplos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$\approx 252.095.170.747$	(4)		
Primos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$\approx 37.979.970.481$	(3)		

 10^{14}

3.204.941.750.802* primos

135.780.321.665* pares de primos gemelos

Número de términos en cada sucesión A o B:	$10^{14} / 30 = 3.333.333.333.333$			
Número aproximado de primos en cada sucesión A o B:	$3.204.941.750.802 / 8 = 400.617.718.850$	(1)		
Número aproximado de pares de primos gemelos en las sucesiones A-B (1 combinación de 3):	$135.780.321.665 / 3 = 45.260.107.221$			
Número aproximado de múltiplos $7m, 11m, \dots$	$3.333.333.333.333 - 400.617.718.850 = 2.932.715.614.483$	(2)		
Número de términos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$ es, aproximadamente, igual a número de múltiplos $7m, 11m, \dots$				
Número aproximado de primos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$400.617.718.850 - 45.260.107.221 = 355.357.611.629$	(3)		
Número aproximado de múltiplos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$2.932.715.614.483 - 355.357.611.629 = 2.577.358.002.854$	(4)		
Número total de términos sucesión B	3.333.333.333.333		$k_{bx} \approx 0,879814684$	
Múltiplos $7m, 11m, \dots$	$\approx 2.932.715.614.483$	(2)	$k_{jx} \approx 0,878829842$	$k_{jx} / k_{bx} \approx 0,998880626$
Primos mayores que 10^7	$\approx 400.617.718.850$	(1)	$c_{jx} \approx 2,028807737$	
Número de términos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$\approx 2.932.715.614.483$	(2)	$k_{0x} \approx 0,863397011$	$k_{0x} / k_{bx} \approx 0,981339623$
Múltiplos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$\approx 2.577.358.002.854$	(4)		
Primos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$\approx 355.357.611.629$	(3)		

 10^{15}

29.844.570.422.669* primos

1.177.209.242.304* pares de primos gemelos

Número de términos en cada sucesión A o B:	$10^{15} / 30 = 33.333.333.333.333$			
Número aproximado de primos en cada sucesión A o B:	$29.844.570.422.669 / 8 = 3.730.571.302.833$	(1)		
Número aproximado de pares de primos gemelos en las sucesiones A-B (1 combinación de 3):	$1.177.209.242.304 / 3 = 392.403.080.768$			
Número aproximado de múltiplos $7m, 11m, \dots$	$33.333.333.333.333 - 3.730.571.302.833 = 29.602.762.030.500$	(2)		
Número de términos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$ es, aproximadamente, igual a número de múltiplos $7m, 11m, \dots$				
Número aproximado de primos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$3.730.571.302.833 - 392.403.080.768 = 3.338.168.221.065$	(3)		
Número aproximado de múltiplos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$29.602.762.030.500 - 3.338.168.221.065 = 26.264.593.809.435$	(4)		
Número total de términos sucesión B	33.333.333.333.333		$k_{bx} \approx 0,888082861$	
Múltiplos $7m, 11m, \dots$	$\approx 29.602.762.030.500$	(2)	$k_{jx} \approx 0,887234568$	$k_{jx} / k_{bx} \approx 0,999044804$
Primos mayores que $10^{7.5}$	$\approx 3.730.571.302.833$	(1)	$c_{jx} \approx 2,016482789$	
Número de términos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$\approx 29.602.762.030.500$	(2)	$k_{0x} \approx 0,873978945$	$k_{0x} / k_{bx} \approx 0,984118693$
Múltiplos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$\approx 26.264.593.809.435$	(4)		
Primos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$\approx 3.338.168.221.065$	(3)		

10^{16} 279.238.341.033.925* primos 10.304.195.697.298* pares de primos gemelos

Número de términos en cada sucesión **A** o **B**: $10^{16} / 30 = 333.333.333.333.333$
Número aproximado de primos en cada sucesión **A** o **B**: $279.238.341.033.925 / 8 = 34.904.792.629.240$ (1)
Número aproximado de pares de primos gemelos en las sucesiones **A-B** (1 combinación de 3): $10.304.195.697.298 / 3 = 3.434.731.897.432$
Número aproximado de múltiplos $7m, 11m, \dots$ $333.333.333.333.333 - 34.904.792.629.240 = 298.428.540.704.093$ (2)
Número de términos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$ es, aproximadamente, igual a número de múltiplos $7m, 11m, \dots$
Número aproximado de primos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$ $34.904.792.629.240 - 3.434.731.897.432 = 31.470.060.721.808$ (3)
Número aproximado de múltiplos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$ $298.428.540.704.093 - 31.470.060.721.808 = 266.958.479.982.285$ (4)

Número total de términos sucesión B	333.333.333.333.333		$k_{bx} \approx 0,895285622$	
Múltiplos $7m, 11m, \dots$	$\approx 298.428.540.704.093$	(2)	$k_{jx} \approx 0,894547415$	$k_{jx} / k_{bx} \approx 0,999175451$
Primos mayores que 10^8	$\approx 34.904.792.629.240$	(1)	$c_{jx} \approx 2,005561339$	
Número de términos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$\approx 298.428.540.704.093$	(2)	$k_{0x} \approx 0,883038021$	$k_{0x} / k_{bx} \approx 0,986319895$
Múltiplos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$\approx 266.958.479.982.285$	(4)	$k_{7x} \approx 0,877833225$	
Primos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$\approx 31.470.060.721.808$	(3)	$k_{11x} \approx 0,884814184$	
			$k_{13x} \approx 0,886559424$	

10^{18} 24.739.954.287.740.860* primos 808.675.888.577.436* pares de primos gemelos

Número de términos en cada sucesión **A** o **B**: $10^{18} / 30 = 33.333.333.333.333.333$
Número aproximado de primos en cada sucesión **A** o **B**: $24.739.954.287.740.860 / 8 = 3.092.494.285.967.607$ (1)
Número aproximado de pares de primos gemelos en las sucesiones **A-B** (1 combinación de 3): $808.675.888.577.436 / 3 = 269.558.629.525.812$
Número aproximado de múltiplos $7m, 11m, \dots$ $33.333.333.333.333.333 - 3.092.494.285.967.607 = 30.240.839.047.365.726$ (2)
Número de términos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$ es, aproximadamente, igual a número de múltiplos $7m, 11m, \dots$
Número aproximado de primos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$ $3.092.494.285.967.607 - 269.558.629.525.812 = 2.822.935.656.441.795$ (3)
Número aproximado de múltiplos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$ $30.240.839.047.365.726 - 2.822.935.656.441.795 = 27.417.903.390.923.931$ (4)

Número total de términos sucesión B	33.333.333.333.333.333		$k_{bx} \approx 0,907225171$	
Múltiplos $7m, 11m, \dots$	$\approx 30.240.839.047.365.726$	(2)	$k_{jx} \approx 0,906651543$	$k_{jx} / k_{bx} \approx 0,999367712$
Primos mayores que 10^9	$\approx 3.092.494.285.967.607$	(1)	$c_{jx} \approx 1,987076711$	
Número de términos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$\approx 30.240.839.047.365.726$	(2)	$k_{0x} \approx 0,897737814$	$k_{0x} / k_{bx} \approx 0,989542445$
Múltiplos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$\approx 27.417.903.390.923.931$	(4)	$k_{7x} \approx 0,8917627$	
Primos $(7m + 2), (11m + 2), \dots$	$\approx 2.822.935.656.441.795$	(3)	$k_{11x} \approx 0,897947688$	
			$k_{13x} \approx 0,899493935$	

Bibliografía

- [1] [Teorema de Dirichlet](#). Wikipedia e información sobre este teorema que aparece en Internet.
- [2] [Teorema de los números primos para progresiones aritméticas](#). Wikipedia e información sobre este teorema en Internet.
- [3] [Teorema de los números primos](#). Wikipedia e información sobre este teorema que aparece en Internet.
- [4] [Conjetura de los Primos Gemelos](#). Wikipedia e información sobre esta conjetura que aparece en Internet.
- [5] [Conjetura débil de Goldbach](#). Wikipedia e información sobre esta conjetura que aparece en Internet.
- [6] [El Diablo de los Números](#). Javier Cilleruelo Mateo. Año 2.000.

Autor: Ramón Ruiz
Barcelona, España
Mail: ramonruiz1742@gmail.com